

GLOBAL SUGARCANE BREEDING / CULTIVAR ATLAS

世界甘蔗育种项目

品种图鉴增订审核稿

2026年9月29日 · 在原图文正文基础上增订

677 条记录	29 个专题	127 张实物照片
品种、试验材料与身份索引	国家、地区与区域协作	另附1张官方性状表

保留育种操作技术、设备、育种基地与试验站正文，增加逐品种说明、图片、育成来源、亲本与可核查出处。

范围声明：本版已显著扩充，但尚不是全球所有历史甘蔗品种的完整总录。记录中包含已发布品种、历史品种、试验材料以及仅确认身份的名称；缺项保留待补。




RB075322 · 巴西



BL (Bululawang) · 印度尼西亚



PHIL 2000-0791 · 菲律宾



R 570 · 法国（留尼汪）



M 1002/02 · 毛里求斯



Nakhon Sawan 1 · 泰国

封面均为对应机构档案中的品种实物照片；逐图来源、页码及说明见各品种条目。图像仅说明来源样本的外观，不能仅凭外观认定品种身份。

阅读说明与收录边界

本文件由三部分组成：本次增订说明；此前54页育种项目正文；677条品种／材料档案及其来源索引。PDF书签可跳转各国专题，离线网页支持名称、别名、亲本、国家和图片状态筛选。

29个专题包括27个国家专题、中国台湾地区专题和东非区域协作专题。将地区或区域协作单列是为准确说明育种资料来源，不把专题数写成国家总数。

年份栏保留原资料口径：品种登记、品种权授权、商业发布、推广目录版次及试验年份各不相同。未取得证据时不补写育成年份。育种单位与引进／登记单位尽量区分，无法核实时明示待核。

同名条目和明确别名经核对后合并；未确认的近似编号不强行归并。部分境外引种资料被用于确认原育成来源，但当地测定结果仍属于引种地条件。

性状资料按各来源的试验和评价口径摘录。不同地点、栽培制度、年份和抗病评级体系之间不作直接产量排名。历史品种与退出推广材料保留状态，不推定为2026年推荐品种。

图片分为：127张本地实物照片、1张官方性状表、217条官方品种图页／图文页入口，以及332条尚未取得可确认照片或图页的条目。本增订篇未用生成图或普通甘蔗照片冒充品种照片。

原54页正文中的真实基地照片、设备图及原理示意图仍按原图注解解释。它们属于育种项目介绍，不能作为新增品种身份的图片证据。

来源机构图片用于本次审核引用；图片权利归原权利人，不附独立转载许可。正式对外发布时按各机构条款核对图片许可与署名。各条网页／PDF链接是事实和图片的核查入口。

资料类型	记录数
性状摘要	87
名称／身份	258
性状档案	286
性状／发布摘要	7
亲本／形态档案	34
状态与性状	1
官方品种档案	1
亲本／原始品种卡	3

各专题覆盖范围与缺口

中国（大陆） · 76条

汇合福建农林大学品种权／登记清单、2018年国家区域试验材料与2025年国家优良品种推广目录。本轮并未覆盖全国所有历史审定与登记品种；CNA品种权、GPD登记和区试材料分别标注。

中国台湾 · 8条

收录台糖历史育种资料中的F160、ROC系列及新台糖29品种权公告。新台糖22号的大陆登记日期不代表其原始育成年份；历史文章不能代替现行完整清单。

巴西 · 135条

完整提取RIDESA 2025英文目录134个RB品种页，并补入可核对的CB38-22引种记录。本轮不等于巴西全部品种，CTC、IAC、SP等系列尚未形成完整逐品种清单。

印度 · 61条

包括PPV&FR官方登记资料中的甘蔗名称以及Co系列近期官方发布、试验和许可材料。登记日期与发布日期分开理解；CoLk、CoPant、CoM等系列仍有缺口。

澳大利亚 · 52条

主体为SRA 2024种植调查列出的品种名称，另补2025年SRAW46、SRA47与SRA48资料。调查出现名称仅证明被统计，不代表完整国家登记册；SRA47保留暂定发布状态。

美国（含波多黎各） · 15条

合并Canal Point及波多黎各相关材料的官方研究、品种资料与境外引种档案。远未覆盖美国所有CP、L、Ho、PR等系列，境外试验表现不能替代美国本地推荐。

南非 · 63条

收录本轮取得的63份SASRI独立品种档案。遵照图片使用限制保留官方品种图页入口，不把无关甘蔗田照片充作品种图片；资料收录不等于当前所有地区都推荐种植。

毛里求斯 · 8条

收录8个可核对的MSIRI品种档案。已附图片均来自对应档案；多个世代的M系列仍未穷尽。

法国（留尼汪） · 14条

法国专题限留尼汪甘蔗育种，含13个R系列档案及R587历史状态。R587因橙锈病问题退出推荐的状态独立注明，不能按新品种宣传。

哥伦比亚 · 29条

主体为Cenicaña 2003年第二版历史品种目录。整份目录的34个材料按育成来源分置不同国家；本专题含CC及CCSP记录，最新CC系列尚未完整覆盖。

阿根廷 · 4条

收录4个具有独立公开页面的TUC品种。EEAOC及其他机构历年TUC、NA等材料尚未形成完整国家清单。

古巴 · 12条

12个C系列材料来自原始研究中的黄叶病评价材料表。出现于试验表并不等于取得商业发布身份；全国INICA历史品种册仍需补入。

墨西哥 · 2条

由哥伦比亚和哥斯达黎加机构档案确认的墨西哥育成材料组成，不代表墨西哥国内全部Mex系列及历年审定品种。

泰国 · 2条

收录可核对的Khon Kaen 3及Nakhon Sawan 1资料。泰国DOA、大学与企业历年育种品种仍需逐一补齐。

印度尼西亚 · 26条

收录P3GI商业品种独立档案中的26个本地材料。VMC 76-16在来源中明确为菲律宾引进，归入菲律宾专题；该机构档案并非印尼全部历史品种。

菲律宾 · 28条

合并27张菲律宾SRA官方品种卡和P3GI档案中确认的VMC 76-16引进记录。照片与品种卡逐一匹配；图卡未列的年份和亲本不作猜测。

日本 · 17条

收录17个NARO公开条目，含糖用、饲料用、能源用途及编号材料。KR/KY编号的商业发布状态另行标注，不能全部视为已登记糖用品种。

巴基斯坦 · 14条

主要据SRDB独立档案，并将CoJ84、CP77-400等直接引种材料归入其育成来源国。YTFG236、NSG59、SPF93的育成来源待核，暂按资料来源归组；禁止或未批准状态如实保留。

孟加拉国 · 38条

取得官方数字标本馆38个甘蔗Isd/BSRI Akh名称；甜菜条目已排除。多项详情页无法取得完整内容，目前以身份索引为主，不能假装具备性状说明或图片。

斯里兰卡 · 26条

合并4个2003系列发布说明与机构育成品种名称索引。保留来源中SL、SLS等具体名称，不擅自合并疑似拼写或编号差异。

斐济 · 14条

依据SRIF商业品种目录收录14个名称，其中部分有熟期与适应性说明。缺亲本、照片或历史发布信息的条目保留缺项。

肯尼亚 · 19条

以2022年官方国家品种表中的19个KEN材料为主体。该来源内的外来育成材料及东非合作材料另按来源归组；不能代表2026年最新全部清单。

哥斯达黎加 · 3条

收录3个LAICA独立品种材料。LAICA 07-20所附为官方性状表，不是品种实物照片；引入的Mex和B系列分别归入墨西哥与巴巴多斯。

厄瓜多尔 · 2条

ECU01、EC02据官方知识产权资料确认身份。原来源未充分给出农艺性状、亲本与对应实物照片，仍为待补的身份条目。

委内瑞拉 · 2条

V系列条目来自Cenicaña历史目录对育成来源的明确记录，不能代表委内瑞拉国家品种总录。

多米尼加共和国 · 1条

RD材料来自Cenicaña历史目录的来源记录，尚未完成多米尼加全国历年品种资料收集。

圭亚那 · 1条

由官方境外品种表确认D系列材料，国家归属按来源说明填写；圭亚那本国完整品种册尚未纳入。

巴巴多斯 · 1条

由LAICA档案确认B77-95及来源，巴巴多斯/区域WICSCBS历年B系列尚未形成完整清单。

东非区域协作 · 4条

EA材料按区域协作专题单列，避免在证据不足时全部归为肯尼亚本国育成。该专题不是一个国家。

尚未完成本轮逐品种官方核查的其他蔗区

危地马拉、越南、缅甸、尼泊尔、埃及、苏丹、埃塞俄比亚、乌干达、坦桑尼亚、马拉维、赞比亚、津巴布韦、莫桑比克、马达加斯加、尼日利亚、塞内加尔、科特迪瓦、喀麦隆、刚果民主共和国、玻利维亚、秘鲁、巴拉圭、乌拉圭、巴拿马、尼加拉瓜、洪都拉斯、萨尔瓦多、牙买加、特立尼达和多巴哥、伯利兹、海地、孟加拉国以外尚未核查的其他蔗区。

这是一份检索缺口清单，不表示这些地区不存在育种项目，也不是世界甘蔗生产国的穷尽清单。已有专题中，历史淘汰品种、地方克隆、私人企业材料及未公开育种编号仍可能遗漏。

世界甘蔗育种项目 技术、设备与基地

21个国家／地区专题 10节操作技术 14张真实照片 ·
33幅原理示意图

本轮沿用2026年9月28日核查的V03现有内容补缺，形成21个国家／地区专题，覆盖20个国家并保留中国台湾专题；法国部分聚焦留尼汪。现有11个专题扩写，新增印度尼西亚、哥伦比亚、阿根廷、墨西哥、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡、孟加拉国、斐济及法国留尼汪10个专题。此范围是本轮增订范围，不声称覆盖世界全部国家或全部在研项目。

版本：2026-09-28 | 状态：待审核，未发布

真实基地照片、真实操作照片与原理示意图分开标注。缺乏现场证据的地点不以其他国家图片替代。

本轮增订与阅读说明

原公开接口129条记录（含1条整篇书稿）已建立ID对照。本稿作为独立增订内容供审核，未修改、合并或删除网站记录。原稿中的历史和品种线索继续保留；同节点多版本的主稿选择，需要在发布整理时另行决定。

照片P01—P15中跳过P08，共14张，均为真实现场图像；有明确地点的基地照片与仅能确认机构或操作内容的照片在图注中区分。N系列21幅基地职能图与D系列12幅技术图均由本稿绘制，共33幅原理示意图。示意图不充当现场证据、地理地图或施工图。引用编号可点击进入来源。

本轮正文已补到机构、具名地点、操作环节、设备功能与试验解释层级。未见的设备型号、完整逐品种系谱、当前全部站点及原始逐点数据不填造。相关缺项集中在审核矩阵中；设备表中的“建议配置”不代表各机构已安装。图像用于当前审核稿，独立公开转载条件仍需逐源核对。

审核项	处理说明
内容对应	保留原129条ID；按章节择段增订，不自动用本稿整篇替换原书。
时间与来源	MSIRI、SRIF等历史站点保留年份；目录和摘要不写成完整实测结果。
技术与设备	确认功能与通用作业配置分开；无厂家或资产证据不补型号和数量。
试验数据	ROC28年份用语待区分；斯里兰卡简表缺少完整年份、重复与误差。
图像定位	地点未注明的真实照片不强指某站；九个专题暂以职能示意配图。

阅读顺序：操作技术（10节）→ 国家／地区专题（21节）→ 设备对照 → 审核矩阵 → 参考来源。PDF书签可定位各节；配套HTML含可点击导航与放大查看的插图。


操作技术 · 1. 从育种目标到亲本组合

甘蔗新品种选育首先要明确服务的生产条件。雨养丘陵、灌溉平原、低温边缘蔗区和湿热蔗区，需要解决的限制因素不同。项目应先定义目标产区、收获月份、预期宿根年限、主要病害与收获方式，再确定选择指标。糖料蔗以单位面积可回收糖收益为核心；能源蔗另行评价生物量、纤维和加工适配性，不能直接套用糖料蔗的低纤维偏好。[ZA1][US5]

亲本筛选要同时看自身表现、已产生后代的表现和遗传互补性。外观优良的商业品种不一定是最好的亲本；某些糖分一般的材料可能携带耐寒或抗病遗传资源，适合进入预育种。亲本表应保留材料原名、种质编号、来源、健康检测、开花记录、已知亲本及使用批次。父母本次序不可互换；多父本混合授粉材料只能记录已知母本和授粉群，不能编造单一父本。[ZA1][LK2]

进入杂交前，给每株亲本和每个组合设置独立编号。推荐将“组合号—花穗号—种子批号—实生株号—无性系号”贯通。条码标签、耐候挂牌、平板采集终端和备份数据库用于减少串号；这些是本稿提出的管理配置，不代表每个基地已安装同一套系统。

原理示意图 · D01 有性重组与无性扩繁分别记录



D01 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图


本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

操作技术 · 2. 开花诱导和花期同步

甘蔗开花受基因型、植株生理状态、日长、温度和水分共同影响。控制日长的目的，是使计划杂交的亲本在合适时间形成可用花穗。田间自然开花条件好的基地可利用当地季节；开花不稳定或亲本花期不遇时，需使用遮光、补光和环境监测设施。Meringa、Mount Edgecombe和海南相关育种基地均有花期调控设施的公开证据。[AU1][ZA2][CN1]

操作顺序是先建立亲本开花历，检查长势与健康状态，再按已验证的本地方案安排处理；处理期逐日记录实际日长、遮光是否漏光、冠层温湿度及异常停电。进入生殖转变后，连续观察花穗发育和散粉时间。不可把某一机构的分钟数、温度或处理天数写成全球通用处方。设备包括定时控制器、遮光幕、补光灯、温湿度记录仪、灌溉装置及供电报警；光周期室是调节花期的设施，并不自动解决亲本间的遗传不亲和问题。

原理示意图 · D02 花期同步靠记录和本地验证



D02 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。


操作技术 · 3. 花粉检查、隔离授粉与授粉后维护

甘蔗花穗含许多小花，杂交管理围绕整穗或穗群展开。授粉前应检查花粉活力和母本自交风险，依据机构方案确定雌雄角色及处理方式。花粉活力染色是初筛，必要时配合萌发试验；不能仅凭花药颜色判定全部花粉有效。显微镜、载玻片、取样工具、活力检测材料与时间记录表，应与组合编号同步。[IN4][AU1]

双亲杂交把确定的父母本花穗置于隔离条件中；多父本杂交则保存授粉群的组成记录。挂穗、传粉、移穗和换袋时，先核对标签，再检查隔离材料和花穗位置，防止混杂。ICAR-SBI公开介绍的高架杂交通道，改善的是花粉收集与传粉操作的可达性，不能将这种设施误称为全自动杂交设备。[IN4]

切离母茎进行杂交时，供水、营养液维护和母穗结实条件会影响最终可用种子数量。古巴原始试验研究过营养液及母茎压条生根的组合，说明授粉后维持母茎活性也是育种环节。其效果属于特定试验条件，不等于田间蔗茎产量增加，也不构成可直接复制的通用营养液配方。[CU3]

原理示意图 · D03 隔离授粉和组合身份



D03 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图


本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。依据[BR1][IN4]。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

操作技术 · 4. 真种子处理、播种与实生苗移栽

花穗形成的真种子常与绒毛等花序材料一起收集，英文资料称fuzz或fluff。它与生产上栽植的蔗茎种段不同。每个组合分别收获、干燥、装袋、保存和开展发芽试验，记录采收日期、储藏条件、播种量及有效出苗数。不能仅以绒毛重量比较两个组合的结实效率。[AU1][FR4]

播种使用洁净基质、带排水的育苗盘和细雾供水。种子很小，应控制覆土和冲刷，按基地既定方法管理。出苗后逐步改善通风，观察猝倒、弱苗和混杂，移栽时保留家系与单株身份。苗床成活率是育苗质量指标，并不等同于成年甘蔗的产量潜力。法国留尼汪的公开育苗记录可作为真种子播种和苗期管理的实景案例。[FR4]

原理示意图 · D04 从真种子到可追溯的实生苗



D04 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图


本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

操作技术 · 5. 家系选择与无性系选择

同一杂交组合的实生后代属于一个家系；不同实生株之间存在遗传差异。早期可以先评价家系总体表现，再从优良家系中选取单株。选中的单株通过种段或健康种苗扩繁形成无性系，才逐步具备重复试验的材料数量。每次扩繁保持编号，不把相邻株或同家系的不同植株混成一个“品种”。[AU1][PH1]

实生阶段重在识别明显不适宜材料及保留足够变异；早期小区容易受边际、缺株和土壤差异影响，不能用单株粗大或单次手持糖度值直接宣布高产。进入行试、初比和高级试验后，逐步扩大样本和重复，增加糖分、纤维、抗病、成熟期及宿根评价。淘汰理由应保留，具有特殊亲本价值的材料可转入预育种保存。[ZA1]

原理示意图 · D05 家系优选与单株保留



D05 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

操作技术 · 6. 多地点、多年份和宿根试验

区域试验的单位是有明确面积的小区。确定当地对照品种、重复数、种植和收获日期后，按合适的随机区组或不完全区组设计布置，记录缺株、补苗、积水、土壤和管理差异。图中的随机区组只是说明随机化原理，实际重复数量应由材料规模、田间变异和预期检验能力决定。

新植与不同宿根代次分开记录。每次收获测小区净收获面积和净蔗重，保留原始称量及剔除规则；田间产量换算为吨/公顷时，统一公斤与平方米单位。糖产量只有在糖分定义和计算公式一致时才可比较。不同国家的CCS、ATR、POCS与蔗汁Brix不是可直接互换的指标。[AU2][LK2]

统计分析至少区分品种、环境、区组和品种×环境互作。报告均值还应给出变异、统计比较方法及有效样本数。某品种在一个试验站领先，不证明它在全部国家、土壤和宿根代次都占优。跨环境试验特别适合识别广适性材料与有明确适用边界的专用品种；不能以国家间不同试验的最高值制作“世界品种排名”。[PK3]

原理示意图 · D06 随机区组小区示例



D06 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图


本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

操作技术 · 7. 糖分测定与设备校准

手持折光仪适合田间快速筛查可溶性固形物；它测得的Brix不等于纯蔗糖含量。正式质量评价通常需要代表性蔗样、破碎或压榨、标准化取汁、折光及旋光等分析，并按本国方法计算质量指标。采样位置、蔗龄、距收获时间、杂质和样品失水都会影响结果。

每批样品使用统一标签，与小区编号对应；天平、折光仪、旋光仪及近红外设备应有校准和质控记录。近红外预测必须用适合材料和环境的参考化学数据建立、验证模型。USDA Houma的2025年报告记录了手持微型近红外的校准工作，不能把“开展校准”写成任何品种均已准确测定。[US5]

原理示意图 · D07 质量评价的指标不能混用



D07 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

操作技术 · 8. 抗病、抗逆和机械适收性评价


抗病筛选与健康种苗生产是两个任务：前者评估品种在明确病原压力下的反应，后者控制繁殖材料携带病原。病害观察应有病原确认、感病和抗病参照、调查时期及评分尺度；自然发病少可能只是接触病原少，不能直接命名为免疫品种。病害试验按相应机构的隔离与操作规范实施，普通品种展示田不能替代专门筛选试验。

[ZA3][JP4]

耐旱试验记录缺水发生的时期、强度及恢复情况；耐涝和耐寒也应描述环境，而不只写“抗逆”。机械适收性同时观察倒伏、茎脆性、叶鞘脱落、株行整齐、基部切割损伤和收后宿根萌芽。比较时固定或记录机器型号、刀盘设置、速度、土壤含水量与地面条件，把品种效应和机械作业效应分开。[US5]

原理示意图 · D08 把机收表现与宿根恢复连起来

把机收表现与宿根恢复连起来



D08 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图


本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

操作技术 · 9. 组织培养与健康种苗扩繁

组织培养主要用于健康种源扩繁、种质保存及某些育种研究。批次流程为母株身份确认与病原检测、材料处理、无菌培养、增殖与生根、炼苗、苗圃复检及田间身份核对。超净工作台、灭菌器、培养架、温控设备及检测仪器分别承担洁净操作、灭菌、培养和检验；它们不能代替母株身份及健康证据。[AR2][JP4]

常规扩繁应控制培养继代和异常株，避免把非预期变异当成同一品种的稳定表现。若项目有意利用体细胞变异，应建立独立育种材料编号并重新开展稳定性和田间评价。瓶苗不等于已经证明无全部病原；“脱毒”应对应具体检测对象与结果。新品种育成和种苗产量应分别统计。[LK1]

原理示意图 · D09 健康种苗的身份与检测关口



D09 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

操作技术 · 10. 可直接采用的育种记录字段


GAKI建议每个项目保存五组关联记录。亲本记录保存身份、来源、健康状态和花期；杂交记录保存父母本、方式、时间与操作者；苗期记录保存真种子批次、发芽及移栽；田间记录保存小区位置、重复、环境、历次收获和原始数据；发布记录保存品种名称、发布机构、日期、适应范围与对应公告。

设备台账不只登记品牌，应记录仪器用途、量程或工作范围、校准时间、样品通量和维护责任。基地台账区分种质圃、杂交场、初选站、区域试验点与健康种苗场。同一地址可以承担多个功能，但某国糖厂旁存在蔗田，并不足以证明那里是杂交育种基地。

图像记录保存图号、原作者或机构、来源页、拍摄地点、日期或“未注明”、图像类型、能证明的内容及使用条件。真实照片仅说明照片可见的现场；原理示意图说明流程或关系。两者均不能替代品种系谱或田间产量的原始记录。

原理示意图 · D10 一套编号连接全过程

一套编号连接全过程



D10 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

中国：南繁杂交、地方选育与区域试验协同

机构、育种基地和试验站

中国甘蔗育种由亲本创新、南繁杂交、主产区选择和产业验证共同构成。广东省科学院南繁种业研究所的海南育种科研基地承接海南甘蔗育种场的工作，崖城系列的重要价值包括利用野生及热带种资源创新亲本。云南省农业科学院甘蔗研究所具有种质资源圃和内陆杂交平台，瑞丽是其内陆杂交的重要地点。福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心则开展遗传改良及相关研究。[CN2][CN3][CN4][CN6]

广西农业科学院甘蔗研究所与广西农垦甘蔗研究所不能按相似名称合并。后者隶属广西亚热带作物研究所体系，其官网列明甘蔗育种、生理生化、气象监测、种质与繁育示范设施。本稿配图采用该机构公开的健康种苗生产现场，图注保留完整机构名称，不把它标成广西所有育种单位的通用照片。[CN5]

操作技术与设备

中国项目可以按“亲本创新—海南或内陆杂交—各蔗区实生与无性系选择—区域试验”组织。海南基地公开报道确认有分子遗传实验室、杂交制种基地和光周期室，支持将花期调控、组合杂交和分子鉴定写成具体环节。各单位实际操作参数仍以本地规程为准；海南完成杂交并不意味着后代在广西、云南或其他蔗区都会表现一致。[CN1]

建议在实生圃采用组合与单株双重编号，在行试阶段增加称重、成熟期测糖和宿根缺株记录。广西农垦甘蔗研究所官网确认具有可控温室和健康种苗工厂化生产条件，可作为设施实例；公开介绍未提供仪器品牌、型号或逐台数量，本稿不补造这些数据。[CN5]

品种、目标性状与试验设计

崖城系列亲本应与供大田推广的商业品种分开建档。亲本创新的价值在于为后续杂交提供有用遗传变异，不能仅用其自身糖分或蔗产量评价全部育种价值。野生血缘的引入还需要后续选择与农艺性状恢复，不能直接等同于新品种已经完成。[CN2]

区域试验建议按主产区的水分条件、土壤、收获季节和机械化程度分层。新植高产而宿根缺株严重的材料，不能仅凭第一季入选。GAKI新增的机收评价应把倒伏、断茎、割茬损伤、田间损失和下一季出芽联系起来，形成品种与机械适配的实测记录。


本节补缺与审核点

本节将原第2章的“机构类型与资料需求”推进为具名机构、基地职能和实际设施的叙述。尚未取得的具体品种父母本、逐点产量和仪器资产清单保留为空；这些字段不影响本文说明育种体系，但不能被统计成已完成的品种档案。中国各单位的商业品种登记与亲本名录应作为后续独立附表继续核对。

中国 · 图像与说明

原理示意图 · N-CN 海南与内陆杂交协作

海南与内陆杂交协作



N-CN 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[CN1][CN3][CN4][CN5][CN6]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

真实现场照片 · P01 健康种苗工厂化生产现场



可见培养架及瓶苗；用于说明健康种苗生产设施，不证明所有材料已通过全部病原检测。

地点：广西农垦甘蔗研究所（广西亚热带作物研究所体系）；日期：未注明。来源：[CN5]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：中国各单位品种登记、完整亲本表与逐站资产清单待补。

澳大利亚：Meringa集中杂交与区域选拔

机构与基地分工

Sugar Research Australia（SRA）的新品种选育从昆士兰Meringa的亲本杂交开始，再将材料放入区域育种和评价体系。其公开流程说明，遗传重组发生在受控选配的杂交环节，而品种能否进入生产取决于后续多年筛选。Q系列属于澳大利亚品种史的重要组成，实际选种还应查阅所在产区的最新品种指南，不能把系列字母当成适应性保证。^{[AU1][AU2]}

操作技术与设施

Meringa使用田间杂交及光周期设施调配花期。每一母穗收获的真种子分别干燥、保存，再进入育苗和家系评价。SRA公开流程中的后代评价试验关注蔗产量、CCS和纤维，随后需要缩小材料数量并进一步评价无性系。^[AU1]

现场更新显示，早期选择还观察株型、站立性、分蘖和病害反应；品种评价也包括连续宿根表现。操作所需设备因此不仅是光周期室，还包括育苗设施、小区收获称量、样品分析和数据管理。无人机可以增加表型信息，但必须通过地面测量验证，不能把影像色泽直接换算成已确认的糖产量。^[AU3]

如何写成可用的品种档案

每个Q或SRA品种应记录明确的品种名、发布资料和适用区域，按区域指南保留病害等级、成熟特点及管理要求。不同地区指南若给出不同定位，应保留差异，不能拼接成“全国均优”。同一品种多年的试验数据需要区分植期、新植与宿根，以及当地对照。^[AU2]

本节补缺与配图

本节用Meringa的实际流程补充原第3章的方法框架。配套基地职能图只表示“集中杂交—区域评价”的关系，并非基地航拍或建筑平面图。由于此次未能可靠取得可离线核对的Meringa原始照片，审核包不以其他国家的杂交棚替代澳大利亚基地照片；官方照片入口列入图像清单。

原理示意图 · N-AU SRA区域选育体系



依据^{[AU1][AU2][AU3]}整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

巴西：RIDESA、CTC与不同品种系列

机构和基地

巴西RB、SP和CTC系列不能被合并为同一个育种单位的产品。RIDESA由大学网络开展RB品种改良；其官方资料列出Serra do Ouro（Murici, Alagoas）和Devaneio（Amaraji, Pernambuco）两处开花杂交与种质基地，另有Bebedouro检疫环节。Devaneio由UFRPE的Carpina甘蔗试验站体系管理。[BR1][BR2]

CTC是另一套育种组织。其公开资料说明，常规杂交利用Bahia州Camamu的开花条件。因而编目时要分别记录育种组织、杂交地点、选拔网络和品种前缀；SP系列的历史归属也应按年代档案追溯，不能倒推为今天RIDESA的同义名称。[BR4]

操作与设备

RIDESA公开图片展示开花、双亲隔离杂交、种子萌发、分苗及田间试验等环节。新引入材料先经过检疫，再进入亲本与杂交体系。这里的检疫温室、处理空间和种质田分别承担不同任务，不能以普通育苗温室代替引种检疫设施。[BR1]

建议将每个杂交组合分配到相应大学和产区时保留统一组合号；各地无性系选择可采用本地适应性指标，但汇总比较前需统一单位和对照。巴西常见糖业质量指标与其他国家指标不完全相同，跨国表格应保留原指标名称、方法和计算口径。


品种利用和区域试验

RB的品种资料应回到RIDESA发布目录核对，CTC品种回到其官方材料核对。热带杂交基地适合形成种子，不等于适合代表所有商业生产环境；后代还必须在目标土壤、水分和收获制度下测试。糖料、乙醇和纤维利用目标也应分别描述，避免将一个育种方向的优势移用于另一个用途。[BR3][BR4]

本节补缺与配图

原第4章的“RB/SP/CTC编目需求”由机构分工和具名基地补实。真实杂交操作照片说明隔离配组的工作形式，图注不把没有明确地点的RIDESA技术照片指定为Serra do Ouro或Devaneio。各品种的完整亲本谱系仍以发布档案为准。

原理示意图 · N-BR 分开记录育种组织



N-BR 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[BR1][BR4]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

巴西 · 图像与说明

真实现场照片 · P02 RIDESA双亲隔离杂交



可见隔离装置内的花穗和茎秆；用于说明花穗配组，不强指为Serra do Ouro或Devaneio。

地点：RIDESA；具体基地未注明；日期：未注明。来源：[BR1]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：照片所属具体杂交基地未注明；SP历史与逐品种谱系待专项补证。

印度：国家杂交圃、种质库与南北生态区

机构与基地

ICAR-Sugarcane Breeding Institute (ICAR-SBI) 总部位于Coimbatore。其区域中心中，Karnal承担北方亚热带条件下的材料评价；Kannur保存重要甘蔗种质；Agali列为研究中心。三个地点的功能不能只用“育种基地”一词抹平，否则会混淆资源保存和商业品种测试。[IN1][IN2]

国家杂交圃与设备实例

Coimbatore的National Hybridization Garden (NHG) 为不同协作中心的育种人员提供亲本选配和杂交平台。官网说明，该设施于1974年设立，并介绍高架杂交通道 (Elevated Hybridization Runways)，用于改善花粉采集和传粉操作。它是有公开证据的专用设备实例，值得在设备图集中独立解释。[IN4]

操作上应先确认亲本身份、开花和花粉状况，再按照组合完成隔离、传粉、收种与后代编号。对异地分发的fluff应附组合资料和种子批号，接收站记录实际出苗和入圃数量。热带总部材料进入北方试验时，需要重新检验成熟、越冬、宿根和病害反应，不能仅沿用南方表现。

Co系列和地区选择

Co系列的档案应区分育成年代、发布事件、推荐生态区及具体品种名。ICAR品种目录可用于核对Co 86032等材料；Co 18009的官方田间示范则说明新品种推广需要育种单位与糖厂、农户共同验证。田间示范属于推广证据，不能替代完整的随机重复试验。[IN5][IN3]

本节补缺与配图

本节补充原第5章欠缺的具名设施、中心分工和操作设备。真实照片为ICAR官网所示Agali中心建筑，只能证明该地点的设施外观；国家杂交圃的设备原理另用示意图说明，不在Agali照片上追加没有依据的设备标签。

原理示意图 · N-IN ICAR-SBI中心网络



N-IN 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[IN1][IN2][IN4]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

印度 · 图像与说明

真实现场照片 · P03 ICAR-SBI Agali研究中心




中心建筑外观；不据此推定建筑内的仪器型号或国家杂交圃所在地。

地点：Agali，印度；日期：未注明。来源：[IN1]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

原理示意图 · D11 高架杂交通道：改善花穗可达性

高架杂交通道：改善花穗可达性



花穗旁的操作通道（仅表示相对位置）

D11 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

方便花粉收集和传粉
依据ICAR-SBI NHG公开功能说明

尺寸与结构未表示
示意不作为搭建方案或安全设计

本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。依据[IN4]。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

审核点：高架杂交通道配原理示意；设备尺寸、型号和现场原图待补。

美国：Canal Point、Houma与合作选育

机构与跨地区协作

USDA-ARS的Canal Point Sugarcane Field Station位于佛罗里达州，承担全国性甘蔗杂交与真种子供应任务，为佛罗里达、路易斯安那以及得克萨斯相关选育项目提供材料。该站公开流程把早期杂交、实生和部分无性系阶段设在站内，后续高级试验转向种植者田块。[US1][US2]

Houma项目面向路易斯安那的较冷生产环境，并与大学、行业伙伴协作。CP、L和HoCP等名称应分别追溯具体项目和发布说明；材料经过Canal Point杂交，不等于后续所有选拔和发布都由该站单独完成。[US5]

实际操作与设备

Canal Point的真实照片可见杂交温室、隔离花穗及站区试验田。2024年官方项目报告分别记录了送往路易斯安那和留在佛罗里达的组合及种子数量，反映同一杂交中心向不同目标区输送遗传材料的方式。这类数量是年度工作量，不能当作已育成新品种数。[US1][US4]

Houma的2025年报告明确研究耐寒、宿根、抗病虫及机械收获相关性状，并开展手持微型近红外校准。这提供了“田间快速表型与实验室参照分析配套”的设备案例。评价近红外时应报告校准集、验证集和误差，不能仅因仪器便携就宣布可替代全部实验室质量检测。[US5]


区域试验与品种档案

路易斯安那项目中的低温生存、春季恢复和宿根表现，与佛罗里达项目的环境背景不同。各项目应同时保留材料来源与当地选择历史；跨州共同亲本并不消除环境差异。对新发布品种应附发布文件、适应范围和抗病描述，再联系实际生产记录。[US1][US5]

本节补缺与图证

本节将原第6章的机构和遗传背景框架补为明确协作网络。审核包收录Canal Point站区鸟瞰和杂交棚两张官方实景，另配跨地区分工示意。示意中的箭头表示材料与评价关系，不表示所有材料必经同一固定年限。

原理示意图 · N-US 材料与评价分工



N-US 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[US1][US2][US5]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

美国 · 图像与说明

真实现场照片 · P04 Canal Point站区鸟瞰



站区及试验田的官方图像；田块处理、面积和照片日期未从图像推算。

地点：Canal Point，佛罗里达州，美国；日期：未注明。来源：[US1]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

真实现场照片 · P05 Canal Point杂交设施内部



可见花穗与杂交隔离设施；用于说明受控杂交空间，不代表完整资产清单。

地点：Canal Point，佛罗里达州，美国；日期：未注明。来源：[US1]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：全国合作不等于全部选拔由一站完成；2024/2025工作量勿当现存库存。

中国台湾：万丹杂交与ROC系列

万丹与柳营的职能

台糖2025年的官方介绍确认，屏东万丹甘蔗育种场是当地甘蔗种质保存和杂交育种的核心基地。台糖2017年永续报告的育种专辑记载，育种场下辖万丹与台南柳营两个试验区，并采用异地保存分散种质风险。柳营的此项功能在本稿标为历史资料所载，不能据此认定2026年的全部场区配置未变。[TW1][TW2]

操作技术与装备说明

异地保存应以同一材料编号连接两个保存地，定期核对身份、更新健康状态和补植记录。杂交阶段需要亲本选择、花期观察、组合隔离及真种子育苗；品种推广还要在生产环境下评价成熟、宿根和机械收获。台糖报告亦记载与研究所合作开展亲缘鉴定，说明分子资料可协助品种身份核对。[TW2]

适用于这些流程的设备包括挂牌与数据记录系统、授粉隔离材料、育苗与测糖设备；本次未取得万丹逐台仪器台账，所以不将通用配置写成已核实的现有型号。分子鉴定证明的是特定标记或亲缘关系，不直接证明某品种在所有地区高产。

ROC品种资料应怎样使用

台糖2025年文章列举ROC10、ROC16、ROC24、ROC28和ROC29等商业品种，可作为现阶段目录的证据入口，但品种的全部父母本、发布年份和适应性仍需逐条查证。此次发现同一历史报告中ROC28的“正式命名”和“育成”叙述所用年份并不一致，不能不作区分地填写单一“发布日期”。[TW1][TW2]

本节补缺与照片说明

本节对应原第7章、尤其是14482和14483等机构及目录稿。配图取自台糖2017年报告的种质保存照片；原图同时提及两个保存地，未单独指明照片属于哪一地，因此图注写“台糖种质保存现场”，不强行标为万丹某块试验田。

原理示意图 · N-TW 台糖育种与保存



N-TW 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[TW1][TW2]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

中国台湾 · 图像与说明

真实现场照片 · P15 台糖甘蔗种质保存现场



2017年永续报告印刷页68（PDF第70页）中的种质图；不单独定名为万丹或柳营。

地点：台糖；图注提及两个保存地，未指明取景场区；日期：2017年报告；拍摄日未注明。来源：[TW2]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：ROC28正式命名与育成年份待区分；柳营现行配置需更新资料。

日本：种子岛的低温适应与南西诸岛品种

机构与试验环境

NARO九州冲绳农业研究中心的甘蔗育种组位于鹿儿岛县种子岛，研究据点保存并利用引进品种和日本野生甘蔗资源。该地处于南西诸岛甘蔗生产的北缘，较低温条件成为筛选低温生长能力与较早糖分积累的试验环境。这里的地理条件是选择压力，不能被简化为“气候越冷育种越好”。[JP1][JP2]

选育技术与品种案例

Ni23提供了一条可核对的系谱实例：官方说明记载以NiF8为母本、Ni9为父本，于1994年杂交，随后开展实生选择并重视宿根萌芽和糖分。其奄美地区表现涉及春植、夏植和宿根等作型；这些结果不能直接外推到所有国家的雨养蔗地。[JP3]

因此，日本项目操作表应同时记录植期、冬季低温、萌芽恢复和收获成熟度。机械适收性评价建议与宿根恢复连续观察：一次收割整齐但翌年有效茎数明显下降的材料，不宜仅凭收获外观作优选。

健康种苗及设备


NARO种苗管理中心公开说明甘蔗为营养繁殖作物，健康原原种供应用于降低种苗传播病害的风险。这一体系与新品种遗传选育衔接，但不是同一任务。病原检测、苗圃繁殖、身份核验及分发记录应分别建档。[JP4]

试验建议配置气象记录仪、小区称量和糖分分析设备，以及出芽与株型影像记录。官方页面未列出种子岛完整仪器型号，本稿只将这些列为作业需要。真实照片使用NARO种子岛研究据点的甘蔗田景观，图中看不见的试验处理不作额外推断。

本节补缺

原第8章以理论框架居多，本节补入实际研究据点、生态选择逻辑和Ni23的可核对父母本。Ni、NiF、NiTn等历史名称必须逐品种核对，不能仅凭前缀推断全部育种者或亲本。

原理示意图 · N-JP NARO研究与种苗体系



N-JP 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[JP1][JP2][JP3][JP4]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

日本 · 图像与说明

真实现场照片 · P06 NARO种子岛研究据点蔗田



研究据点官方田景；具体品种、处理与产量不能从照片判断。

地点：种子岛，日本；日期：未注明。来源：[JP1]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：健康种苗体系与新品种育成分别建档；逐站仪器型号未取得。

泰国：素攀武里杂交与旱作区评价

机构、基地和网络

泰国农业厅（DOA）品种数据库给出了具名育种地点与试验路径。Nakhon Sawan 1的资料记载，亲本Q76与CP63-588在Suphan Buri（素攀武里）田间作物研究中心杂交，后代在Nakhon Sawan（那空沙旺）选择，并开展标准比较与农户田试验。因此应把杂交站、初选站及农户验证点分别列入数据库。[TH2]

操作技术与设备

其记录展示了从杂交、单株选择、产量与宿根评价到多地点测试的连续过程，而非一次示范即可完成品种释放。泰国旱作选育的记录应特别标明土壤质地、雨养或灌溉、种植季节和宿根代次；建议配置气象与土壤水分监测、称重、糖分测定和带定位的小区调查设备。

这些设备为流程所需配置；官方品种条目并未给出每个站的资产清单。本稿不把昆虫或白叶病自然发生较少，直接表述为品种对病原具有稳定抗性。


品种档案与地区边界

Khon Kaen 3应以DOA专门条目单独建档，不能与Nakhon Sawan 1合并。后者的试验涉及多种土壤、地点以及新植和宿根，其原始数据库记录的研究路径有助于完善试验台账。将品种引入其他国家时，还必须重做当地适应性和健康状况评价。[TH1][TH2]

本节补缺与图证

本节扩充原14194的单节概述，并配Nakhon Sawan 1官方品种照片。该照片用于观察株丛与田间形态；图片没有单独证明其产量、抗病等级或具体拍摄站点。站点分工另用原理示意表示。

原理示意图 · N-TH 以品种路径连接地点



依据[TH2]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

泰国 · 图像与说明

真实现场照片 · P14 Nakhon Sawan 1官方品种田景



株丛及田间形态；照片不证明产量、抗病等级或实验设计。

地点：泰国DOA品种资料；拍摄站点未注明；日期：未注明。来源：[TH2]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：图为Nakhon Sawan 1路径；不能代替全国现行育种基地总表。

南非：Mount Edgecombe杂交与分区育种

机构和基地分工

South African Sugarcane Research Institute (SASRI) 的品种改良包括商业育种、品种特性研究、渐渗育种和基因组等工作。商业育种流程由杂交、选择、基因型测试、扩繁和发布组成。Mount Edgecombe提供杂交设施；Gingindlovu等研究站承担后代选择与评价，并结合种植者田块测试。[ZA1][ZA2]

操作技术与实际设施

SASRI现场报道说明，优良亲本在Mount Edgecombe杂交棚中诱导开花并配组；大量后代经过多年筛选逐渐缩小范围。该报道列有Gingindlovu、Empangeni、Pongola、Komati和Bruyns Hill等试验站活动线索，能证明具名试验网络，不能把某篇活动报道的站数与现行总数机械相加。[ZA2]

SASRI另有引种检疫设施，处理外来材料的健康风险，并提供组织培养等相关服务。这使“引入新遗传资源”与“防止病原随材料传播”成为并行的工作。设备与设施说明可确认到杂交棚、检疫和培养功能层级，未公开的品牌、数量和自动化水平不补写。[ZA3]

选择目标与试验解释

N系列品种的价值要联系适应区、糖产量、宿根、病虫害和加工性状评价。渐渗育种使用近缘或祖先资源扩展遗传基础，其材料通常需要继续筛选，不能把预育种材料直接列为商业新品种。环境差异显著时，适用范围比全国统一排序更有意义。[ZA1]

本节补缺与配图

本节将原14193、14499的概要与结构稿补为实际机构及流程。照片来自SASRI对2024年Gingindlovu开放日的报道，属于研究站田间交流现场；图注与当前资产状态、设备采购或试验结果分开。

原理示意图 · N-ZA SASRI功能分工



依据[ZA1][ZA2][ZA3]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

南非 · 图像与说明

真实现场照片 · P07 Gingindlovu研究站田间交流



2024年开放日报道中的现场照片；说明研究站与种植者交流，不作为设备数量或产量证据。

地点：Gingindlovu，南非；日期：2024年报道；拍摄日未注明。来源：[ZA2]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：试验站名单按资料年份保存；不由活动报道推算现行站点总数。

毛里求斯：MSIRI的育种、区域评价与技术服务

机构和试验基地

Mauritius Sugarcane Industry Research Institute（MSIRI）的前身于1953年建立，长期为甘蔗与糖业提供研究支持。其历史出版目录列明Réduit总部，以及Belle Rive、Union Park、Pamplemousses试验站。本稿将该站点名单注明为历史官方资料，不把旧名单直接当作2026年站区数量统计。[MU1][MU4]

选育操作与设备功能

MSIRI公开服务包括真种子生产、从fuzz选择新品种、品种引进与评价、试验设计训练，以及组织培养、DNA指纹和分子诊断相关服务。这些信息使原来空泛的“引种与演替”框架可以落实为具体操作链：材料引入或杂交，建立家系，选择无性系，多环境评价，再与繁殖推广衔接。[MU2]

实施时，需把育种田的表现和实验室样品联系起来。建议使用可追溯样品标签、糖分分析及田间称量设备；分子检测平台对应身份或病原检验，而不是自动给出产量排名。官网未公开逐站设备型号，本稿仅确认其服务能力，不推断每个试验站都有完整分子实验室。


品种与环境评价

M系列名称需要逐一查阅品种资料，不能凭编号自行推定亲本或发布年代。试验应兼顾不同农业气候环境，并把农户试验与研究站控制试验放在各自证据层级。MSIRI培训课程同时包含田间试验和试验站访问，说明育种能力包括设计、分析与推广环节。[MU3]

本节补缺与图证

本节对应14192、14497、14498的毛里求斯框架稿。审核包采用基地职能示意，并附官方历史资料入口。旧建筑照片分辨率及地点证据有限，未作为2026年真实基地照片使用；后续可补当前站景与具名试验小区原图。

原理示意图 · N-MU MSIRI历史站点与服务



依据[MU1][MU4]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

古巴：国家杂交与地方品种验证

机构、地点与材料证据

古巴INICA相关研究体系开展甘蔗品种选育与适应性评价。Caraballoso等发表于2015年的原始研究明确记载，营养液杂交试验在Sancti Spíritus的国家甘蔗杂交中心开展，作者单位地址位于Guayos。该证据可以补入基地档案，但论文记载的是研究时期的机构与地点，不能由此认定全部现行组织结构。[CU3]

杂交操作技术

研究比较了切离花茎的营养液维护及母茎压条生根处理，关注的是授粉后可获得的幼苗数量。其技术意义在于：配好父母本后，还要维持母茎供水与花穗发育，才能将遗传组合转为可选择的后代。论文中的增效属于特定1999—2004年试验条件，不能改写成田间甘蔗增产倍数。[CU3]

本稿配套示意图只表达母茎、供液、生根部位和花穗的关系，不提供未经本地验证的化学配方。相关设备功能包括花穗支架、供液容器、隔离材料、环境记录和种子批次管理；现有基地的具体型号和数量尚未核实。


品种评价与推广

古巴公开原始品种试验研究还涉及C95-416、C97-445等材料及地方生产条件。使用这类证据时，应保留试验地点、作型与对照，不能把一处合作社的优胜结果当作全国结论。国家杂交获得后代、地方试验筛选适应性、种苗体系扩繁供种，是需要分别记录的三个层次。[CU2]

本节补缺

本节补充原14191、14496欠缺的具名杂交地点与本国操作技术实例。此次未取得可可靠定位并核对的基地实景，采用明确标注的原理示意；古巴的完整现行基地名单和全部品种目录仍列为后续专项核查项。

原理示意图 · N-CU 杂交与地方验证分层




依据[CU3][CU2]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

古巴 · 图像与说明

原理示意图 · D12 切离母茎的授粉后维护

切离母茎的授粉后维护



D12 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

本稿绘制，用于解释正文关系与记录要点。依据[Cu3]。示例不代表特定基地的实际布置或实测结果。

审核点：图依据2015论文及1999—2004试验；当前站点配置与实景未确认。

印度尼西亚：Pasuruan研究体系与现代品种评价

机构与历史基地

Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) 是印度尼西亚糖业研究机构，Pasuruan是其重要研究所在地。机构官方历史将其起源与早期甘蔗改良、sereh病问题及糖业竞争联系起来。因此，POJ历史应作为现代甘蔗改良史的一部分，但不能用历史上的POJ育种成就代替今天P3GI各项在研项目的进度。^[ID1]

现代育种及操作技术

P3GI官方服务包含甘蔗育种、农艺和糖业工艺等专业内容。育种项目应把种质材料、杂交后代和已推广品种分开编号，再将田间选择与糖厂质量需求联系起来。2025年的官方培训报道记录了P3GI与企业开展甘蔗田间生产培训，说明研究成果需要通过产业协作形成可实施的栽培与管理方法。^{[ID2][ID3]}

建议对当地材料建立发芽、分蘖、倒伏、病害、成熟与宿根记录；试验站和糖厂共同采样时保持样品身份一致。若存在引进种质，保存原始材料名与引入后的地方编号，不因当地重新命名而丢失来源。

设备、试验站与使用边界


完整作业需要种质保存田、杂交与育苗设施、糖分分析及小区称量设备。这些是适用配置；目前取得的机构页面未提供各设备的具体型号，也不足以确认全国全部育种站名录。设备图采用功能示意，不画成P3GI实验室实际平面布局。

PS等现代系列应以正式发布资料逐条验证系谱和适应区；历史POJ、国外引种与现代地方育成品种分别归档。某糖厂示范效果良好，不代表全岛不同土壤和水分条件均适用。

本节与原稿衔接

原整篇书稿已经涉及爪哇和POJ，本节补现代机构、田间工作和设施功能，避免重复堆写历史。照片为官方2025年培训活动实景，明确标为“技术培训”，不当作种质库、杂交棚或产量试验的现场证据。

原理示意图 · N-ID P3GI现代工作与历史衔接



N-ID 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据^{[ID1][ID2][ID3]}整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

印度尼西亚 · 图像与说明

真实现场照片 · P09 P3GI与企业的田间技术培训



2025年培训实景；并非种质库或杂交棚。原图分辨率较低，保留较小显示。

地点：P3GI官方活动；准确田块未注明；日期：2025年5月报道；拍摄日未注明。来源：[ID2]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：培训照片不是试验小区证据；全国基地名录、具体设备待补。

哥伦比亚：Cenicaña的分环境品种改良

机构与基地

Cenicaña在San Antonio de los Caballeros设实验站，开展甘蔗杂交、材料评价及相关研究。其2020年报明确记载本地杂交工作，并记录从墨西哥CIDCA引进杂交材料。这说明哥伦比亚既有本地品种创造，也利用国际合作扩大后代来源。[C01]

操作技术与试验体系

其育种研究将杂交、后代选择、病害筛选和不同环境的品种评价联系起来。年报分别讨论半干旱、湿润和山麓环境，因而CC系列不能用一个总平均值代表所有生产条件。田间布置建议明确环境分组，并在各组中使用合适的当地对照。[C01][C02]

真种子或无性材料进入新地区时，来源、检疫和编号应先明确。家系早期淘汰与高级品系区域试验分开记录；后者需同时积累蔗产量、质量、宿根和病害数据。疾病筛选的结论必须对应检测方法和材料批次，不能把“参加过抗病试验”改写成“已抗全部病害”。

设备与品种档案

根据上述流程，建议配备组合隔离设施、育苗盘、小区称量系统、糖分与纤维测定及病害鉴定条件。已有来源能够确认这些研究功能，但未给出完整资产台账，本稿不据常识填入设备品牌。CC品种应保留发布资料及适用环境，不与巴西RB或墨西哥MEX系列混记。

年报数据的准确用法

2020年报所列2019—2020季2,350次杂交，是育种工作量，包含不同杂交方式，不能转述为2,350个发布品种。本文只用该事实解释育种起始群体规模，不将它外推为当前年度数量。基地职能图表达“本地杂交+材料引入—分环境选择”的结构，真实基地照片仍需另补。[C01]

原理示意图 · N-CO Cenicaña分环境选育



N-CO 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[C01][C02]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

阿根廷：Tucumán的EEAOC育种与健康种苗

机构与基地

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) 位于Tucumán省Las Talitas。其甘蔗遗传改良项目为地方糖业开发新品种；目标不仅涉及蔗糖，还联系乙醇、生物量及产业收益。TUC系列的机构归属应与巴西品种及其他来源材料区分。[AR1][AR3]

杂交、选择和设备

EEAOC技术文章描述了亲本诱导开花、双亲杂交、实生苗移栽和后续选择。对该流程可配置光周期管理、隔离授粉、育苗、田间称量及质量分析设施；文章中的历史年度规模不能作为2026年仍不变的生产能力。[AR1]

项目记录应将“某年做出的组合”与“某年释放的品种”分开。成熟期较早的材料，必须在目标收获期测定品质，而非只比较同一日的植株高度。区域试验还应把霜冻或低温损伤、收获后恢复和宿根表现纳入解释。


Vitroplantas与品种扩繁

EEAOC的Vitroplantas项目生产高质量种蔗，为主要栽培品种及新释放品种提供扩繁基础。组织培养与健康种苗管理帮助把育种成果送到生产端，但它们本身不创造一个已经通过全部评价的新品种。母株身份、卫生状态和后续苗圃批次应形成连续记录。[AR2]

代表材料与配图

TUC 02-22的官方品种资料可作为独立档案入口，性能描述必须保留原试验范围。此次检查发现EEAOC一篇文章头图为一般作物种子拼图，已排除其作为甘蔗育种实景。本文采用TUC品种资料中的蔗田照片及流程示意，并注明照片不自动证明取景地为Las Talitas。[AR3]

原理示意图 · N-AR EEAOC育种与推广衔接



依据[AR1][AR2][AR3]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

阿根廷 · 图像与说明

真实现场照片 · P10 TUC 02-22资料中的蔗田



真实田间形态图；不将照片直接定位到Las Talitas，也不据图推断产量。

地点：EEAOC品种资料；取景田块未注明；日期：未注明。来源：[AR3]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：TUC资料蔗田照片未注明准确田块；不能当作Las Talitas定位照片。

墨西哥：Tapachula杂交站与MEX品种体系

机构与基地

Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar (CIDCA) 的甘蔗杂交站位于Chiapas州 Tapachula一带。CONADESUCA项目报告把该站的实验室建设及分子改良工作作为具体项目说明；其地址资料指向Tapachula—Talismán公路一带。这里与附近其他机构的试验场不能仅因地理相近而合并。[MX2][MX3]

操作技术与装备

CONADESUCA与CIDCA的合作项目涉及适用于多倍体甘蔗的DArT基因分型基础。基因分型可以支持材料区分和遗传分析，但要经过性状关联和独立验证，才能用于具体目标的选择。不能把“建立分型技术”写成“已经实现任何性状的精准预测”。[MX2]

建议把杂交站的亲本身份、组合记录与后续田间选择连接起来；组织培养实验室承担培养与材料繁殖，检测平台承担身份或遗传信息分析。实验室能力与实际品种改良成果分别统计，设备型号不从项目名称推断。

国际合作与品种试验


Cenicaña年报记录从CIDCA获取杂交材料，提供了独立于机构宣传的合作证据。MEX系列需要按具体品种追溯母父本、选择地点和发布资料，而不是把海外引入的每个克隆都算成本国重新育成。[CO1][MX1]

墨西哥各产区的雨量、土壤和收获制度不同。建议在目标产区布置区域试验并记录宿根、病害和糖分。跨国共享后代不等于试验结果可跨国通用。

本节补缺与配图

本节按原核查的新增国家候选补入。此次看到CIDCA网站存在与房地产模板相关的图像文件名及通用图注，未将这些图片认定为基地实景；审核包使用基地职能示意，并附政府项目原文入口，待取得可定位的站区照片后替换。

原理示意图 · N-MX CIDCA与合作材料



N-MX 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[MX2][MX3][CO1]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

巴基斯坦：Faisalabad选育与多环境检验

机构和工作基础

旁遮普省Sugarcane Research Institute位于Faisalabad，隶属Ayub Agricultural Research Institute相关体系，官网将育种、农艺、病理、昆虫和加工技术列为研究工作。其历史年度报告记录从斯里兰卡、南非以及巴基斯坦不同来源取得fuzz并开展实生选择，说明外来杂交种子也是材料来源。[PK1][PK2]

实际操作与试验站含义

接收fuzz后应按原组合分别播种、登记出苗与家系，再将入选实生株转入无性系试验。引入种子与引入成熟品种是不同工作，不能把进口组合数直接算成品种数。材料来源地点也不一定是本项目当年的田间试验地点。[PK2]

Faisalabad研究人员的2023年多环境研究在旁遮普三个不同气候地点评价材料，支持在正文中加入品种×环境互动和稳定性分析。由于本次取得的摘要未完整列出地点与全部处理细节，本文不补造站名和每站产量；正式数据库应继续从全文提取这些字段。[PK3]

设备和目标性状

建议配置种子育苗设施、田间株数和茎径测量工具、称量、糖分分析与环境记录设备，并将赤腐病等当地重要病害评价和产量试验结合。接收材料时的健康与身份管理仍然必要；来自国外的优良组合并不能保证当地抗病。

本节补缺与图片

本节把原整篇中的零散巴基斯坦线索整理为国家正文。配图为种子来源、家系选择和多环境测试关系示意，明确不是Faisalabad现场照片。当前设备台账、完整试验站名单和品种发布目录还需逐项补证。

原理示意图 · N-PK Faisalabad选育与环境验证



N-PK 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[PK1][PK2][PK3]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

菲律宾：La Granja的连续选择程序

机构与研究中心

菲律宾Sugar Regulatory Administration（SRA）的La Granja Agricultural Research and Extension Center（LGAREC）位于La Carlota，另有Pampanga的研究与推广中心。两者应分别建档，不能将Pampanga照片标成La Granja。JIRCAS的2024年官方出访记录明确提到在La Granja观察实生选择试验及深植试验。[PH2][PH3]

连续选择的真实案例

SRA的2020年报记载Phil 2017系列从单株阶段进入行试，再开展扩繁和病害筛选。报告列明1,082个行试克隆中选择345个进入下一阶段。这些数字属于该系列和报告年度，不是菲律宾历年育成品种总数。它展示了为什么“已有正文的项目数量”与“真正通过选育程序的品种数量”必须区分。[PH1]

操作技术与设备


行试记录包括Brix、分蘖、茎径、单茎重及开花等性状。扩繁同时进行病害筛选，可在材料数量逐渐增加时减少明显不适宜候选。建议将测量设备的校准、病害试验批次及田间小区号关联起来；手持糖度值用于筛选，正式产糖评价仍需对应质量分析方法。[PH1]

深植试验属于栽培技术与材料适配研究，不能单凭一次试验访问推定La Granja的全部品种已适合深植。育种与农艺协作的价值，在于把根系、宿根恢复和生产条件放到可比较的试验中。[PH2]

本节补缺与配图

本节将Phil系列、La Granja和Pampanga的零散信息组织为国家专题。图中区分“实生—行试—扩繁筛病—区域测试”，不把年报里的阶段数量画成当前库存；可靠现场照片尚不足，先配流程图及官方年报页码线索。

原理示意图 · N-PH SRA研究中心与选择阶段



N-PH 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[PH1][PH2][PH3]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

斯里兰卡：Uda Walawe、杂交分站与SL系列

机构与基地网络

Sugarcane Research Institute (SRI) 的主要研究中心在Uda Walawe。2023研究计划还列出Deniyaya的Enselwatte甘蔗育种分站，并把Uda Walawe、Sevanagala、Pelwatte及其他产业地点纳入相关研究。各地点应按杂交、研究站或产业验证功能分别标注，不能全部当作相同类型的试验站。[LK1][LK3]

操作技术与设备

SRI的作物改良工作结合常规育种、种质评价、组织培养与分子技术，关注糖产量、成熟期、宿根、病害、干旱及机械化适应。组织培养产生的变异研究，应与保持品种身份的常规扩繁分别管理。相关设备功能包括育苗、无菌培养、分子诊断、田间称量和质量分析；未公开的资产型号不补填。[LK1]

可核对的系谱和产量实例

SRI于2023年发布的2003系列说明记载，SL 03 336来源为CP 69 1052自交；SL 03 1025的母本记为SL 71 16，授粉方式为多父本混合授粉，不能给它虚填一个确定父本。同一说明给出不同地点的品种与对照平均蔗产量，可用于建立带出处的示范数据表。[LK2]


以SL 03 336为例，说明书中的Uda Walawe平均蔗产量为102.4吨/公顷、当地对照SL 83 06为61.7吨/公顷；Pelwatta为97.0吨/公顷、当地对照SL 96 128为91.6吨/公顷。这里展示的是资料中的地点差异，不能据此宣布显著增产，因为该简表未同时提供全部试验年份、重复与误差。[LK2]

病害解释和配图

说明书中人工筛选与不同地点自然发生的白叶病反应并不完全一致，正说明“筛选条件”必须和结果同时保存。官方花穗照片用于解释种质与开花，并未标出具体拍摄田块，因此不把它定名为Enselwatte实景。基地网络另用示意图。

原理示意图 · N-LK SRI基地与产业评价

SRI基地与产业评价



N-LK 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[LK1][LK3]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

斯里兰卡 · 图像与说明

真实现场照片 · P11 SRI作物改良页面的甘蔗花穗



用于观察开花材料，不强指为Enselwatte分站，不从花穗照片判断亲本活力。

地点：斯里兰卡SRI；具体田块未注明；日期：未注明。来源：[LK1]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：网络依据2023计划；品种简表缺少完整年份、重复与误差。

孟加拉国：Ishurdi研究与环境适应评价

机构和基地定位

Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）位于Ishurdi、Pabna，是该国糖料作物研究机构。官方期刊目录包含甘蔗开花、花粉活力、杂交、病害和环境适应研究；大学数字植物图鉴亦设置BSRI释放甘蔗品种的独立目录。这些来源能支持建立机构与品种检索入口，但不能仅凭论文目录还原全部试验数据。

[BD1][BD2][BD3]

育种操作技术

项目应从可追溯种质和组合开始，记录开花、花粉、结实与苗期表现，再开展无性系评价。孟加拉国研究目录中包含盐带品种评价，因此试验信息应明确盐分环境、对照品种和管理条件，而不是仅给品种贴“耐盐”标签。盐分浓度和测量方法不同，结果不可简单并表排名。[BD2]

设备与试验站编目

按这些任务，建议配置花粉观察、育苗、田间测产、糖分分析、土壤电导率及气象记录设备。Ishurdi是确认的研究机构所在地；其他地方试验点必须从对应原始论文或年报逐条提取，不因出现某个地名就自动列为BSRI常设育种站。此次也未取得全国逐站资产清单。


品种资料与图像

Isd或BSRI命名材料需要保留原名和官方发布证据，品种图鉴用于识别入口与形态说明，不能代替完整系谱。未能确认拍摄地点的普通甘蔗田照片，不用于证明Ishurdi设施。本文配环境评价原理图，真实基地影像另列待补。

本节补缺

原核查在第3部未检出独立孟加拉国章节，本节以国家正文建立研究体系与数据边界。盐带、病害和宿根性能的数值表仍须取得原始全文后填入；不能把只有题名的论文写成已经验证某品种优胜的证据。

原理示意图 · N-BD BSRI研究与证据层级



N-BD 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[BD1][BD2][BD3]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

斐济：Drasa核心与岛屿环境选拔

机构和基地

Sugar Research Institute of Fiji（SRIF）的作物改良资料介绍种质、杂交、早期选择和高级试验。斐济议会保存的2015年报明确列出Drasa、Wairuku和Dobuilevu的种质资源相关地点。这些是有年份的历史基地证据，不能当作当前所有站点面积、人员和设备未变的证明。[FJ1][FJ4]

操作流程与设备

在育种材料管理上，应把本地亲本、海外材料和亲本创新后代分开记录，再按组合进行实生与无性系筛选。SRIF公开流程说明曾调整高级评价阶段以缩短世代间隔；这种程序优化需要与实际材料、试验年限及宿根资料配套，不能简单理解成少做一年试验就一定提高效率。[FJ1]

建议配置育苗、杂交隔离、称量、糖分与纤维检测，以及倒伏和风害记录工具。岛屿生产环境中的风雨事件可能改变品种相对表现，因此既要记录受损程度，也要记录恢复和后续宿根表现。此处为试验设计建议，并非SRIF逐台设备的核实清单。

品种利用

SRIF商业品种页面列有Mana等材料，说明不同品种在成熟、倒伏及产量方面有不同定位。页面的比例和描述若缺少明确统计年份，不转述为2026年全国种植面积。当地推荐品种同样不能自动视为适合所有其他岛国。[FJ2]

本节补缺与配图

本节补原核查列出的斐济空缺，采用Drasa与其他已知地点的功能示意。此次官网部分页面的搜索存档可读、直接下载失败，故引用状态单独记录；不因此补画为真实基地照片，也不把历史年报站点当作已实地核查的现状。

原理示意图 · N-FJ SRIF历史资源地点



N-FJ 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[FJ1][FJ4]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

法国留尼汪：eRcane的多生态站点选育

机构与育种基地

eRcane的前身为1929年设立的La Bretagne甘蔗试验与遗传研究机构。其官方资料把La Bretagne的引种和杂交设施与岛上七个选择站联系起来，利用不同气候、海拔和生产条件筛选材料。留尼汪作为法国海外地区单列专题，不能重复统计为独立国家。[FR1][FR2]

从真种子到多地点比较

eRcane以杂交真种子产生新的遗传组合，育苗后分配到不同选择站，经过逐级筛选，再让优良无性系进入跨地点比较。官方实景可见真种子及幼苗作业；照片中的育苗操作与生产上用蔗茎种段栽植是两种不同环节。

[FR1][FR4]

设施功能可分为亲本与杂交、育苗、站内试验、跨站测试以及分析与数据管理。建议保留各站的气象、土壤和收获条件，避免把所有站平均后掩盖专门适应某类环境的材料。

R系列与实际站点案例

2023年发布资料记载R 590在Menciol站选出；该站位于Saint-André较高地带。R 589的资料与Beaufonds站相关。两个案例说明，品种的“选出地点”和后续“推荐适应区”相关但并不相同，仍需要其他环境的验证。

[FR3]

本节补缺与照片

本节补充原候选名单之外的重要国际育种体系，并与法国CIRAD等机构的相关研究保持名称区分。审核包收录eRcane官方真种子与幼苗操作照片，图注明来源、类别和拍摄日期未明确；它们不被当作全部七个试验站的实景证明。

原理示意图 · N-FR eRcane多生态选择



N-FR 原理示意图 | 非实景、非地理地图、非施工图

依据[FR1][FR2][FR3]整理；仅表示已识别的地点或研究环节，非全国全部站点清单。

法国留尼汪 · 图像与说明

真实现场照片 · P12 eRcane真种子播种操作



手工操作育苗容器的真实现场；不是田间种段栽植，也不把文件名当作隔离授粉证据。

地点：eRcane，留尼汪；具体作业间未注明；日期：未注明。来源：[FR1]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

真实现场照片 · P13 eRcane实生育苗操作



种子与幼苗工作环节；成苗数量不能等同于新品种数量。

地点：eRcane，留尼汪；具体选择站未注明；日期：2021年报道；拍摄日未注明。来源：[FR4]。审核引用，公开转载条件未独立确认。

审核点：法国留尼汪专题；不能按独立国家计数，照片未覆盖全部七站。

设备功能对照

下表按任务说明设备用途，明确已公开的功能实例与本稿建议。并非采购清单或各机构资产盘点。

环节	设备或设施	操作用途	证据或边界
亲本与身份	耐候牌、条码、数据终端	贯通亲本、组合、苗株和小区身份	通用建议；各基地实际系统未逐一核实
花期同步	光周期室、遮光幕、补光及控制器	控制日长并记录异常	Meringa、海南及SASRI有公开设施证据 [AU1] [CN1] [ZA2]
环境记录	温湿度、气象、土壤水分记录仪	解释开花、胁迫和环境差异	通用建议；测点位置和校准需记录
花粉检查	显微镜、取样与活力检测材料	观察花粉状态并核对时间	按机构已验证方法；染色不等同全部花粉可育
隔离授粉	隔离装置、花穗支架、组合标签	减少花粉混杂并维持组合身份	RIDESa、Canal Point照片有实例 [BR1] [US1]
高穗操作	高架杂交通道EHR	改善花粉收集和传粉可达性	ICAR-SBI国家杂交圃公开介绍 [IN4]
授粉后维护	供液容器、茎秆支撑、记录工具	维持切离母茎和花穗发育	古巴原始研究案例；不是通用配方 [CU3]
真种子育苗	育苗盘、洁净基质、细雾供水	保持组合分开并提高有效成苗	eRcane官方实景 [FR1] [FR4]
田间测产	小区收获工具、称量装置、面积测量	获得净收获面积和净蔗重	通用配置；单位转换与漏收规则必须明确
田间筛查	手持折光仪	快速测定可溶性固形物Brix	不直接等同蔗糖或可回收糖
品质分析	破碎/压榨、天平、折光和旋光仪	标准化取汁、参考分析与质量指标	方法按当地体系；不混用CCS/ATR/POCS
近红外预测	NIR或微型近红外设备	经校准后快速预测目标指标	Houma 2025报告有校准工作 [US5]
分子信息	DNA提取与基因分型平台	身份核验、遗传信息和标记研究	MSIRI、CIDCA等有功能资料 [MU2] [MX2]
健康种苗	超净台、灭菌器、培养架及检测设备	无菌培养、炼苗与健康核验	EEAOC、NARO及中国机构实例 [AR2] [JP4] [CN5]
机收评价	收获机参数记录、损失取样、影像	分开品种、机械设置与环境效应	建议新增；连续记录下一季宿根恢复
数据质控	校准记录、原始数据与备份	追踪异常、修正和版本	本稿建议；不是现行全球统一标准

逐专题审核矩阵

专题	真实照片	仍待补证
中国	P01	中国各单位品种登记、完整亲本表与逐站资产清单待补。
澳大利亚	待补；配示意图	Meringa可靠原始实景未收入；各区域具名试验站及仪器型号待补。
巴西	P02	照片所属具体杂交基地未注明；SP历史与逐品种谱系待专项补证。
印度	P03	高架杂交通道配原理示意；设备尺寸、型号和现场原图待补。
美国	P04、P05	全国合作不等于全部选拔由一站完成；2024/2025工作量勿当现存库存。
中国台湾	P15	ROC28正式命名与育成年份待区分；柳营现行配置需更新资料。
日本	P06	健康种苗体系与新品种育成分别建档；逐站仪器型号未取得。
泰国	P14	图为Nakhon Sawan 1路径；不能代替全国现行育种基地总表。
南非	P07	试验站名单按资料年份保存；不由活动报道推算现行站点总数。
毛里求斯	待补；配示意图	站点来自历史官方出版目录；现行站况、设备与可靠原图待补。
古巴	待补；配示意图	图依据2015论文及1999—2004试验；当前站点配置与实景未确认。
印度尼西亚	P09	培训照片不是试验小区证据；全国基地名录、具体设备待补。
哥伦比亚	待补；配示意图	2020年报工作量只对应原年度；当前基地实景和设备型号待补。
阿根廷	P10	TUC资料蔗田照片未注明准确田块；不能当作Las Talitas定位照片。
墨西哥	待补；配示意图	官网模板图片已排除；站区原图、实验室当前资产与发布资料待补。
巴基斯坦	待补；配示意图	2023研究摘要不够还原三地站名；全文、重复与设备清单待补。
菲律宾	待补；配示意图	照片未补齐；1082→345只表示2020年报特定系列阶段筛选。
斯里兰卡	P11	网络依据2023计划；品种简表缺少完整年份、重复与误差。
孟加拉国	待补；配示意图	论文目录不等于试验结果；全国站点、实景、数值结果仍待补证。
斐济	待补；配示意图	2015年报非2026资产普查；部分官网链接失效，需更新实景与当前资料。
法国留尼汪	P12、P13	法国留尼汪专题；不能按独立国家计数，照片未覆盖全部七站。

原内容ID与增订衔接

原公开接口129条记录（含1条整篇书稿）已建立ID对照。本稿作为独立增订内容供审核，未修改、合并或删除网站记录。原稿中的历史和品种线索继续保留；同节点多版本的主稿选择，需要在发布整理时另行决定。

对应范围	原记录数	增订用途
CN	8	中国：南繁杂交、地方选育与区域试验协同
AU	15	澳大利亚：Meringa集中杂交与区域选拔
BR	12	巴西：RIDESA、CTC与不同品种系列
IN	11	印度：国家杂交圃、种质库与南北生态区
US	10	美国：Canal Point、Houma与合作选育
TW	16	中国台湾：万丹杂交与ROC系列
JP	18	日本：种子岛的低温适应与南西诸岛品种
TH	1	泰国：素攀武里杂交与旱作区评价
ZA	2	南非：Mount Edgecombe杂交与分区育种
MU	3	毛里求斯：MSIRI的育种、区域评价与技术服务
CU	2	古巴：国家杂交与地方品种验证
其他原记录	31	整篇、综述、资源、分子与机收技术等关联
合计	129	完整逐ID题名和处理状态见Original-Record-Mapping.csv

新增10个专题没有伪造网站内容ID；由用户审核后确定编排和新增记录。原英文正文为空的情况，本轮不声称已完成英文翻译。

参考来源与核查状态

核查日期：2026-09-28。编号和标题可点击访问来源。完整网址另存References.csv；原照片来源与图注见Photo-Sources.csv。

[CN1] 中国海南育种科研基地

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 502: Bad Gateway

[CN2] 崖城系列亲本研究

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 502: Bad Gateway

[CN3] 云南甘蔗研究所

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[CN4] 瑞丽内陆杂交基地

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[CN5] 广西农垦甘蔗研究所设施

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[CN6] 福建国家甘蔗工程技术研究中心

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[AU1] SRA新品种选育流程

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 403: Forbidden

[AU2] SRA区域品种指南

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 403: Forbidden

[AU3] SRA田间育种实况

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 403: Forbidden

[BR1] RIDESA杂交与种质基地

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[BR2] RIDESA历史

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[BR3] RIDESA品种目录

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[IN1] ICAR-SBI区域中心

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[IN2] ICAR-SBI Agali

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[IN3] Co 18009田间示范

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 502: Bad Gateway

[US1] USDA Canal Point任务

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[US2] CP育种流程

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[US3] Canal Point百年育种

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[US4] USDA 2024项目报告

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[TW1] 台糖万丹育种场

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[TW2] 台糖育种场任务与贡献

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[JP1] NARO种子岛研究据点

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[JP2] NARO育种组

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[JP3] Ni23品种原始说明

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[JP4] 日本甘蔗健康原原种

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[TH1] 泰国Khon Kaen 3

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[TH2] 泰国Nakhon Sawan 1

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[ZA1] SASRI育种体系

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[ZA2] SASRI Gingindlovu试验站

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[ZA3] SASRI检疫设施

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[MU1] MSIRI历史与职责

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[MU2] MSIRI育种与实验服务

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[MU3] MSIRI培训与试验站

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[CU1] 古巴杂交营养液试验原始论文

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 403: Forbidden

[CU2] 古巴品种比较原始论文

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[ID1] P3GI机构历史

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[ID2] P3GI田间培训

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[ID3] P3GI专业服务

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[CO1] Cenicaña 2020年报

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[CO2] Cenicaña遗传改良技术

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[AR1] EEAOC育种设施与流程

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[AR2] EEAOC健康种苗

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[AR3] EEAOC TUC 02-22

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[MX1] CIDCA育种机构

机构线索；模板图像不作为基地证据

[MX2] CONADESUCA DArT项目

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 403: Forbidden

[MX3] CIDCA实验室报告

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 403: Forbidden

[PK1] Faisalabad研究所

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 502: Bad Gateway

[PK2] 旁遮普育种年报2013-14

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 502: Bad Gateway

[PK3] 旁遮普多环境试验2023

目录/摘要层级；不用于还原未见的试验详情

[PH1] 菲律宾SRA 2020年报

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[PH2] JIRCAS菲律宾实生选择现场

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[PH3] SRA Pampanga中心

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[LK1] SRI作物改良部

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[LK2] 斯里兰卡2023品种说明

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[LK3] 斯里兰卡2023研究计划

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[BD1] BSRI官网

检索内容可核；直接获取失败：HTTP Error 502: Bad Gateway

[BD2] BSRI盐带品种研究目录

目录/摘要层级；不用于还原未见的试验详情

[BD3] BSRI品种大学图鉴

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[FJ1] SRIF育种流程

历史年报或检索存档；部分官网路径失效，现行状态待更新

[FJ2] SRIF商业品种

历史年报或检索存档；部分官网路径失效，现行状态待更新

[FJ3] SRIF 2020年报

历史年报或检索存档；部分官网路径失效，现行状态待更新

[FR1] eRcane品种创造

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[FR2] eRcane基地

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[FR3] eRcane R589/R590发布

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[FR4] eRcane实生育苗

已取得页面或PDF；按正文引用范围使用

[IN4] ICAR国家杂交圃与高架杂交通道

浏览检索已核查；未保存离线全文

[IN5] ICAR品种目录

浏览检索已核查；未保存离线全文

[BR4] CTC常规育种与Camamu

浏览检索已核查；未保存离线全文

[MU4] MSIRI 1953-2005历史资料（试验站）

浏览检索已核查；未保存离线全文

[US5] USDA Houma 2025年度报告

浏览检索已核查；未保存离线全文

[CU3] 古巴营养液杂交原始论文PDF

浏览检索已核查；未保存离线全文

[FJ4] 斐济议会存档SRIF 2015年报

历史年报或检索存档；部分官网路径失效，现行状态待更新

中国（大陆） | 品种与材料档案

76条记录 · 核查日期2026-09-29

汇合福建农林大学品种权／登记清单、2018年国家区域试验材料与2025年国家优良品种推广目录。本轮并未覆盖全国所有历史审定与登记品种；CNA品种权、GPD登记和区试材料分别标注。

中糖3号

CN-9c1dbbca1 | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：中国热带农业科学院热带生物技术研究所

亲本：粤糖99-6 × ROC28

年份及口径：2025（目录版次）

适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区

图片：尚缺可确认的品种照片

高产高糖、宿根性较好、较抗旱，适合机械收获。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：品种实物照片

来源：CN-2025 · PDF第191页

中蔗10号

CN-0acf0fc14 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：黄有总、陈保善、张木清、姚伟、张桂英、邓祖湖、邹承武、蒋洪涛、赵新旺、蒙姣荣、温荣辉、陈如凯

亲本：未列明

年份及口径：2020.06.19（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2020）450014，发证日期2020.06.19。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2020）450014。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗13号

CN-dab2c4a5d | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：张木清、姚伟、陈保善、张桂英、邓祖湖、邹承武、黄有总、蒋洪涛、赵新旺、蒙姣荣、温荣辉、陈如凯

亲本：未列明

年份及口径：2020.06.19（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2020）450013，发证日期2020.06.19。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2020）450013。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗1号

CN-18574ffe2 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：陈保善、黄有总、张木清、邓祖湖、覃勇、蒋洪涛、温荣辉、张桂英、邹承武、姚伟、农永前、陈如凯、蒙姣荣

亲本：未列明

年份及口径：2020.06.19（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2020）450017，发证日期2020.06.19。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2020）450017。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗6号

CN-d5f1d89b3 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：陈保善、蒋洪涛、张木清、温荣辉、黄有总、邓祖湖、姚伟、张桂英、蒙姣荣、邹承武、陈如凯、徐良年

亲本：未列明

年份及口径：2020.06.19（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2020）450016，发证日期2020.06.19。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2020）450016。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗9号

CN-a05b91eae | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：陈保善、张木清、姚伟、蒋洪涛、覃勇、黄有总、邹承武、邓祖湖、张桂英、徐良年、农永前、蒙姣荣、温荣辉、陈如凯

亲本：未列明

年份及口径：2020.06.19（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2020）450015，发证日期2020.06.19。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2020）450015。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。补充来源：<https://zys.moa.gov.cn/gzdt/202507/P020250721568526002533.pdf>；高产、稳产，抗黑穗病、抗早衰和抗寒，脱叶性较好。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农44号

CN-6f1601c5c | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：徐良年、黄潮华、邓祖湖、张木清、罗俊、林兆里、黄国强、高三基、赵新旺、张华、蒋洪涛、傅华英

亲本：未列明

年份及口径：2019.04.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD 甘蔗（2019）350013，发证日期2019.04.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD 甘蔗（2019）350013。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农45号

CN-f35766395 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：邓祖湖、黄国强、林兆里、罗俊、张木清、徐良年、黄潮华、傅华英、蒋洪涛、赵新旺、张华、王鲲鹏

亲本：未列明

年份及口径：2019.04.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD 甘蔗（2019）350012，发证日期2019.04.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD 甘蔗（2019）350012。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农46号

CN-b113ef25c | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：徐良年、邓祖湖、黄国强、林兆里、罗俊、张木清、陈保善、黄潮华、张华、袁照年、傅华英、高三基、赵新旺、蒋洪涛、王鲲鹏

亲本：未列明

年份及口径：2020.06.19（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2020）350021，发证日期2020.06.19。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2020）350021。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农47号

CN-a3827d2c1 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：黄潮华、邓祖湖、林兆里、袁照年、徐良年、黄国强、罗俊、赵新旺、张木清、陈保善、傅华英、高三基、蒋洪涛

亲本：未列明

年份及口径：2020.06.19（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2020）350020，发证日期2020.06.19。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2020）350020。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农48号

CN-0f4937fa5 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：邓祖湖、徐良年、赵新旺、黄国强、罗俊、张木清、黄潮华、林兆里、陈保善、姚伟、蒋洪涛、袁照年、傅华英、王鲲鹏

亲本：未列明

年份及口径：2022.03.10（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2022）350006，发证日期2022.03.10。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2022）350006。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农49号

CN-778620a84 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：黄国强、黄潮华、赵新旺、徐良年、邓祖湖、罗俊、林兆里、张木清、蒋洪涛、陈保善、姚伟、袁照年、王鲲鹏、傅华英

亲本：未列明

年份及口径：2022.03.10（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2022）350005，发证日期2022.03.10。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2022）350005。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农50号

CN-7ad15cac9 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：赵新旺、徐良年、邓祖湖、黄潮华、黄国强、张木清、蒋洪涛、姚伟、罗俊

亲本：未列明

年份及口径：2022.03.10（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2022）350007，发证日期2022.03.10。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2022）350007。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农51号

CN-89667ea99 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学、广西大学

亲本：未列明

年份及口径：2023.09.21（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2023）350003，发证日期2023.09.21。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2023）350003。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

中蔗福农52号

CN-1bc6e4b59 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学、广西大学

亲本：未列明

年份及口径：2023.09.21（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2023）350004，发证日期2023.09.21。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2023）350004。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

云瑞07-1433

CN-e8ad6871e | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所

亲本：云瑞99-155 × L 75-20

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

云瑞09-315

CN-ce8994a40 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所

亲本：CL 69-52 × 云瑞05-285

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

云瑞10-187

CN-ebef92ec7 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所

亲本：ROC 20 × 云瑞05-282

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

云瑞10-701

CN-cfefc7bc7 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所

亲本：云瑞08-18 × 云瑞05-704

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

云蔗0551

CN-83d0c633c | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所／云南云蔗科技开发有限公司

亲本：桂糖90-56 × 新台糖23

年份及口径：2025（目录版次）

适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区

图片：尚缺可确认的品种照片

高产高糖，抗早衰，抗甘蔗黑穗病，脱叶性及宿根性较好。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：品种实物照片

来源：CN-2025 · PDF第189页

云蔗08-1095

CN-fe271c80d | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所

亲本：CP 84 -1198 × 科5

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第11轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

云蔗08-2060

CN-98a8dac12 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所

亲本：粤糖93-159 × Q 121

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

云蔗081609

CN-a27e4ed30 | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所／云南云蔗科技开发有限公司

亲本：云蔗94-343 × 粤糖00-236

年份及口径：2025（目录版次）

适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区

图片：尚缺可确认的品种照片

高糖、高产、适应性较广，宿根性较强。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：品种实物照片

来源：CN-2025 · PDF第187页

云蔗09-1028

CN-ae6979ae9 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所

亲本：云瑞15-178 × 闽糖86-2121

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

云蔗09-1601

CN-dae6ec860 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南省农业科学院甘蔗研究所

亲本：CP 94-1100 × 川糖89-103

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

壮糖6号

CN-7d6671316 | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：崇左市农业科学研究所

亲本：桂糖17 × 粤糖00319

年份及口径：2025（目录版次）

适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区

图片：尚缺可确认的品种照片

高产高糖、宿根性较好，抗倒伏和抗旱。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：品种实物照片

来源：CN-2025 · PDF第194页

德蔗07-36

CN-cff7abebc | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南德宏州甘蔗科学研究所

亲本：桂糖92-66 × CP 67-412

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第11轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

德蔗09-78

CN-33baa5216 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南德宏州甘蔗科学研究所

亲本：桂糖94-119 × ROC 10

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

德蔗09-84

CN-fc886dfc5 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：云南德宏州甘蔗科学研究所

亲本：桂糖94-119 × ROC 10

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

柳城07-150

CN-428c307f0 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：柳城县甘蔗研究中心

亲本：粤糖85-177 × ROC 22

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第11轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

柳城07-500

CN-0f9b66ec9 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：柳城县甘蔗研究中心

亲本：粤糖92-1287 × CP 72-1210

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

柳城07-506

CN-f597edfa4 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：柳城县甘蔗研究中心

亲本：粤糖85-177 × ROC 22

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

桂柳05136

CN-46fc26ac9 | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：柳城县甘蔗研究中心

亲本：CP84-1254 × 新台糖22

年份及口径：2025（目录版次）

适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区

图片：尚缺可确认的品种照片

抗早衰、适应性较强、早中熟，宿根及抗倒性较好。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：品种实物照片

来源：CN-2025 · PDF第186页

桂糖06-1492

CN-fd1f99149 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广西农业科学院甘蔗研究所

亲本：CP 72-1210 × 湛蔗92-126

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

桂糖06-2081

CN-9801c2536 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广西农业科学院甘蔗研究所

亲本：桂糖00-122 × 崖城97-47

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第11轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

桂糖08-1180

CN-5be0151d5 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广西农业科学院甘蔗研究所

亲本：ROC 26 × ROC 22

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第11轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

桂糖09-12

CN-90f488553 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广西农业科学院甘蔗研究所

亲本：ROC 24 × 粤农79-780

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

桂糖42号

CN-754ee0d27 | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所

亲本：新台糖22 × 桂糖92-66

年份及口径：2025（目录版次）

适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区

图片：尚缺可确认的品种照片

抗倒、抗旱衰、早熟、高糖，适应性较广。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：品种实物照片

来源：CN-2025 · PDF第185页

桂糖44号

CN-81b4bf9c3 | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所

亲本：新台糖1 × 桂糖92-66

年份及口径：2025（目录版次）

适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区

图片：尚缺可确认的品种照片

丰产、早熟、高糖，抗倒和抗旱，适机收。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：品种实物照片

来源：CN-2025 · PDF第188页

海蔗22

CN-b83c52328 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广州甘蔗糖业研究所

亲本：粤糖93-159 × ROC 22

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第11轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

福农043504

CN-3c1bdfef2 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：高三基、许莉萍、徐良年、林彦铨、袁照年、邓祖湖、陈如凯、罗俊、傅华英、徐景升、黄国强、高世武

亲本：未列明

年份及口径：2019.04.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD 甘蔗（2019）350011，发证日期2019.04.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD 甘蔗（2019）350011。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农07-2020

CN-58767a45d | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学甘蔗综合研究所

亲本：粤糖91-976 × LC 85-384

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

福农07-3206

CN-978ff66c6 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学甘蔗综合研究所

亲本：90-1211 × 77-797

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

福农09-12206

CN-be88890ab | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学甘蔗综合研究所

亲本：CP 65-357 × 崖城97-40

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

福农092201

CN-3023433c5 | 名称／身份 | 机构列示CNA品种权记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：邓祖湖、黄国强、林兆里、罗俊、张木清、徐良年、黄潮华、傅华英、袁照年、蒋洪涛、赵新旺、张华、王鲲鹏

亲本：ROC 22 × 桂糖00-122

年份及口径：2022.08.18（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

别名：福农09-2201

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条CNA品种权记录，编号CNA20191000449，发证日期2022.08.18。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：CNA20191000449。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等同于GPD登记编号。亲本另据2018年区试材料论文附表1，
<https://zwxb.chinacrops.org/article/2018/0496-3490/0496-3490-44-5-723/T4-0496-3490-44-5-723.html>

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农094095

CN-696184eb6 | 名称／身份 | 机构列示CNA品种权记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学

亲本：粤糖93-159 × 云蔗91-790

年份及口径：2024.04.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

别名：福农09-4095

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条CNA品种权记录，编号CNA20191006209，发证日期2024.04.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：CNA20191006209。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。亲本另据2018年区试材料论文附表1，
<https://zwxb.chinacrops.org/article/2018/0496-3490/0496-3490-44-5-723/T4-0496-3490-44-5-723.html>

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农097111

CN-07a69c5fa | 名称／身份 | 机构列示CNA品种权记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：徐良年、邓祖湖、张木清、黄国强、林兆里、罗俊、黄潮华、张华、袁照年、傅华英、高三基、王鲲鹏

亲本：桂糖96-44 × ROC 11

年份及口径：2022.08.18（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

别名：福农09-7111

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条CNA品种权记录，编号CNA20191000442，发证日期2022.08.18。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：CNA20191000442。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。亲本另据2018年区试材料论文附表1，
<https://zwxb.chinacrops.org/article/2018/0496-3490/0496-3490-44-5-723/T4-0496-3490-44-5-723.html>

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农103722

CN-719284b58 | 名称／身份 | 机构列示CNA品种权记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学

亲本：未列明

年份及口径：2024.04.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条CNA品种权记录，编号CNA20191006729，发证日期2024.04.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：CNA20191006729。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农11-2105

CN-ee6cacaee | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学甘蔗综合研究所

亲本：川蔗89-103 × 云瑞05-770

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

福农112907

CN-5f9cb714a | 名称／身份 | 机构列示CNA品种权记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学

亲本：未列明

年份及口径：2025.05.01（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条CNA品种权记录，编号CNA20211002495，发证日期2025.05.01。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：CNA20211002495。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农1401

CN-41f040c92 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学

亲本：未列明

年份及口径：2023.12.26（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2023）350012，发证日期2023.12.26。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2023）350012。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农1402

CN-6d43843c2 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学

亲本：未列明

年份及口径：2023.12.26（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2023）350013，发证日期2023.12.26。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2023）350013。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农15号

CN-03f9ac268 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：罗俊、高三基、徐良年、邓祖湖、许莉萍、张华、高世武、黄潮华、傅华英、陈平华

亲本：未列明

年份及口径：2021.07.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2021）350011，发证日期2021.07.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2021）350011。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农170306

CN-379fa2a23 | 名称／身份 | 机构列示CNA品种权记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建农林大学

亲本：未列明

年份及口径：2025.05.01（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条CNA品种权记录，编号CNA20211000888，发证日期2025.05.01。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：CNA20211000888。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农28号

CN-46dbf771d | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：邓祖湖、陈如凯、林彦铨、徐良年、高三基、许莉萍、罗俊、傅华英、袁照年、徐景升、黄国强、高世武

亲本：未列明

年份及口径：2018.11.02（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2018）350017，发证日期2018.11.02。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2018）350017。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农30号

CN-c526ec353 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：罗俊、林彦铨、许莉萍、徐良年、陈如凯、袁照年、邓祖湖、傅华英、高三基、黄国强、郭晋隆、王恒波、高世武

亲本：未列明

年份及口径：2020.06.19（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2020）350018，发证日期2020.06.19。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2020）350018。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农38号

CN-b4d72bbfc | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：徐良年、罗俊、阙友雄、邓祖湖、陈如凯、林彦铨、张华、袁照年、许莉萍、林兆里、傅华英、高世武、高三基、林炜乐、黄国强、王鲲鹏

亲本：未列明

年份及口径：2018.11.02（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2018）350019，发证日期2018.11.02。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2018）350019。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农39号

CN-e6179e172 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：邓祖湖、陈如凯、林彦铨、徐良年、高三基、许莉萍、罗俊、傅华英、袁照年、徐景升、张华、黄国强、高世武、林炜乐、林兆里、谢传金

亲本：未列明

年份及口径：2018.11.02（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2018）350020，发证日期2018.11.02。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2018）350020。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农40号

CN-56cc1b671 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：徐良年、袁照年、张华、林彦铨、林兆里、陈如凯、邓祖湖、黄国强、罗俊、傅华英、黄潮华、高三基、王鲲鹏、高世武

亲本：福农93-3406 × 粤糖91-976

年份及口径：2018.11.02（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2018）350021，发证日期2018.11.02。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2018）350021。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。补充来源：<https://zwxb.chinacrops.org/article/2018/0496-3490/0496-3490-44-5-723/T4-0496-3490-44-5-723.html>；2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农41号

CN-a6a5543b1 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：邓祖湖、陈如凯、林彦铨、徐良年、许莉萍、袁照年、林兆里、罗俊、张华、高三基、阚友雄、黄国强、傅华英、高世武、王鲲鹏、黄潮华

亲本：未列明

年份及口径：2018.11.02（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2018）350022，发证日期2018.11.02。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2018）350022。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农42号

CN-816d64808 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：陈如凯、徐良年、阙友雄、袁照年、林彦铨、罗俊、邓祖湖、张华、林兆里、许莉萍、傅华英、高世武、高三基、黄国强、徐景升、黄潮华

亲本：未列明

年份及口径：2019.04.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD 甘蔗（2019）350010，发证日期2019.04.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD 甘蔗（2019）350010。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农43号

CN-fb522373a | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：邓祖湖、陈如凯、高三基、林彦铨、林兆里、袁照年、黄潮华、徐良年、张华、黄国强、傅华英、罗俊、高世武、王鲲鹏

亲本：未列明

年份及口径：2019.04.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD 甘蔗（2019）350009，发证日期2019.04.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD 甘蔗（2019）350009。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农914621

CN-d71fa48b7 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：邓祖湖、高三基、徐良年、许莉萍、张木清、罗俊、张华、傅华英、黄国强、赵新旺、黄潮华、林兆里

亲本：未列明

年份及口径：2021.07.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2021）350009，发证日期2021.07.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2021）350009。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

福农940403

CN-9bae9900c | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：张华、邓祖湖、高三基、陈平华、许莉萍、徐良年、罗俊、傅华英

亲本：未列明

年份及口径：2021.07.12（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2021）350008，发证日期2021.07.12。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2021）350008。

核查说明：该表为机构成果清单，不是全国全部品种。CNA编号不等于GPD登记编号。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

粤甘43

CN-d3f257a44 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广州甘蔗糖业研究所

亲本：粤糖93-213 × 粤糖93-159

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

粤甘46

CN-4a474cc45 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广州甘蔗糖业研究所

亲本：粤糖00-236 × 桂糖96-211

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

粤甘47

CN-866ddf31c | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核
育成来源：中国（大陆）；用途：糖用
育种／来源单位：广州甘蔗糖业研究所
亲本：粤农73-204 × ROC 22
年份及口径：2018（论文）
适用／评价区域：国家区域试验材料
图片：尚缺可确认的品种照片
2018年论文附表列为第11轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。
核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。
待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：CN-LIN

粤甘48

CN-96649aeaf | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核
育成来源：中国（大陆）；用途：糖用
育种／来源单位：广州甘蔗糖业研究所
亲本：HOCP 95-988 × 粤糖97-76
年份及口径：2018（论文）
适用／评价区域：国家区域试验材料
图片：尚缺可确认的品种照片
2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。
核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。
待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：CN-LIN

粤甘50

CN-eb34a1d51 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核
育成来源：中国（大陆）；用途：糖用
育种／来源单位：广州甘蔗糖业研究所
亲本：粤糖96-86 × 粤糖99-66
年份及口径：2018（论文）
适用／评价区域：国家区域试验材料
图片：尚缺可确认的品种照片
2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。
核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。
待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：CN-LIN

粤糖15356

CN-d6ad70a9b | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录
育成来源：中国（大陆）；用途：糖用
育种／来源单位：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）
亲本：ROC22 × HoCP01-1142
年份及口径：2025（目录版次）
适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区
图片：尚缺可确认的品种照片
产量和含糖量较高，抗病及宿根性较强。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。
待补：品种实物照片
来源：CN-2025 · PDF第193页

粤糖93159

CN-55444524b | 性状摘要 | 国家优良品种推广目录收录

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）

亲本：粤农73-204 × CP72-1210

年份及口径：2025（目录版次）

适用／评价区域：中国南方蔗区，按原目录分区

图片：尚缺可确认的品种照片

早熟、高产、高糖、抗旱、抗倒伏。以上为2025国家优良品种推广目录的概述，具体栽培条件与病害鉴定见原条目。

待补：品种实物照片

来源：CN-2025 · PDF第190页

赣蔗07-538

CN-1d0c9432e | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：江西省甘蔗研究所

亲本：ROC 10 × CP 57-614

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

闽糖02-205

CN-1b956bc4c | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建省农业科学院甘蔗研究所

亲本：崖城90-3 × ROC 10

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第10轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

闽糖06-1405

CN-38313a061 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建省农业科学院甘蔗研究所

亲本：闽糖92-649 × ROC 10

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第11轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

闽糖07-2005

CN-83e5398e8 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建省农业科学院甘蔗研究所

亲本：崖城73-512 × ROC 22

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

闽糖09-104

CN-7ccaa41f0 | 名称／身份 | 区试品种／品系，发布待核

育成来源：中国（大陆）；用途：糖用

育种／来源单位：福建省农业科学院甘蔗研究所

亲本：桂糖90-420 × ROC 10

年份及口径：2018（论文）

适用／评价区域：国家区域试验材料

图片：尚缺可确认的品种照片

2018年论文附表列为第12轮国家甘蔗区域试验材料。可据此核对亲本和选育单位；不能仅凭参试记录认定已通过登记或适宜商业推广。

核查说明：表内同时包括品种与未发布品系。

待补：品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-LIN

中国台湾 | 品种与材料档案

8条记录 · 核查日期2026-09-29

收录台糖历史育种资料中的F160、ROC系列及新台糖29品种权公告。新台糖22号的大陆登记日期不代表其原始育成年份；历史文章不能代替现行完整清单。

F160

TW-2ddebe901 | 名称／身份 | 历史品种记录

育成来源：中国台湾；用途：糖用

育种／来源单位：台湾糖业公司

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：中国台湾

图片：尚缺可确认的品种照片

台糖历史文章列示的本地选育品种；原文反映其成文时的种植结构，不能将当年主栽比例作为当前比例。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：TW-HIST

ROC1

TW-0076f0cf6 | 名称／身份 | 历史品种记录

育成来源：中国台湾；用途：糖用

育种／来源单位：台湾糖业公司

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：中国台湾

图片：尚缺可确认的品种照片

台糖历史文章列示的本地选育品种；原文反映其成文时的种植结构，不能将当年主栽比例作为当前比例。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：TW-HIST

ROC10

TW-9ccccf320 | 名称／身份 | 历史品种记录

育成来源：中国台湾；用途：糖用

育种／来源单位：台湾糖业公司

亲本：未列明

年份及口径：1984（推广）

适用／评价区域：中国台湾

图片：尚缺可确认的品种照片

台糖历史文章记载1984年开始推广，曾长期作为主要原料蔗；该历史地位不等于2026年的面积统计。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：TW-HIST

ROC16

TW-b6a0d7c0a | 名称／身份 | 历史品种记录

育成来源：中国台湾；用途：糖用

育种／来源单位：台湾糖业公司

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：中国台湾

图片：尚缺可确认的品种照片

台糖历史文章列示的本地选育品种；原文反映其成文时的种植结构，不能将当年主栽比例作为当前比例。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：TW-HIST

ROC24

TW-668468345 | 名称／身份 | 历史品种记录

育成来源：中国台湾；用途：糖用

育种／来源单位：台湾糖业公司

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：中国台湾

图片：尚缺可确认的品种照片

台糖历史文章列示的本地选育品种；原文反映其成文时的种植结构，不能将当年主栽比例作为当前比例。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：TW-HIST

ROC27

TW-98046b633 | 名称／身份 | 历史品种记录

育成来源：中国台湾；用途：糖用

育种／来源单位：台湾糖业公司

亲本：未列明

年份及口径：2001（命名）

适用／评价区域：中国台湾

图片：尚缺可确认的品种照片

台糖历史文章记载于2001年育成命名；后续育种活动应另查新资料，不能从旧文断言此后永无新品种。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：TW-HIST

新台糖22号

CN-23d5eca20 | 名称／身份 | 非主要农作物登记记录

育成来源：中国台湾；用途：糖用

育种／来源单位：台湾糖业研究所（福建、广西、广州相关机构引进）

亲本：未列明

年份及口径：2018.11.02（发证）

适用／评价区域：未在本条来源中列明

别名：ROC22；新台糖22

图片：尚缺可确认的品种照片

福建农林大学机构清单列示本条非主要农作物登记记录，编号GPD甘蔗（2018）350018，发证日期2018.11.02。本条来源未附产量、抗性和适宜区域数据。

编号：GPD甘蔗（2018）350018。

核查说明：育成为台湾糖业研究所；2018年GPD记录为大陆登记，不能作为台湾育成年。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CN-REG

新台糖29

TW-bd2c9117b | 名称／身份 | 品种权核准记录

育成来源：中国台湾；用途：糖用

育种／来源单位：具体权利人及育种者见公告附件

亲本：未列明

年份及口径：2025-06-12（核准）

适用／评价区域：中国台湾

图片：尚缺可确认的品种照片

2025年6月12日有官方植物品种权核准公告。公告页面足以确认名称和核准日期；本次未取得可读特性附件，农艺数据与照片待补。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：TW-29

巴西 | 品种与材料档案

135条记录 · 核查日期2026-09-29

完整提取RIDESA 2025英文目录134个RB品种页，并补入可核对的CB38-22引种记录。本轮不等于巴西全部品种，CTC、IAC、SP等系列尚未形成完整逐品种清单。

CB 38-22

BR-3fec747b2 | 性状摘要 | 境外引进栽培记录

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：巴西育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：肯尼亚（此来源评价地）

图片：尚缺可确认的品种照片

巴西来源；肯尼亚1998年发布记录，成熟期18至20个月，耐黑穗病及水分胁迫。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第19页

RB002504

BR-98086a895 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：SP80-1816 × ?

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：未测；叶灼病：未测；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第135页 原图／官方图页

RB002754

BR-ec2a6c273 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB835205 × ?

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；橙锈病：中间型；叶灼病：中间型；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第124页 原图／官方图页

RB005014

BR-f5d210fa6 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：SP80-1816 × RB855536

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：高。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：高；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第114页 原图／官方图页

RB006970

BR-6239d45f4 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB855536 × SP80-1816

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第113页 原图／官方图页

RB011549

BR-cbd55c421 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB91539 × RB9367

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：低；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；橙锈病：中间型；叶灼病：耐受；花叶病：原产区未见（非免疫证明）。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第111页 原图／官方图页

RB01494

BR-7d1cdd6dc | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB931530 × RB845210

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：原产区未见（非免疫证明）。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第112页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB015177

BR-da35f45f0 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：SP70-1284 × SP80-3280

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第110页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB015935

BR-b27c896ea | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB855156 × SP80-1816

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第109页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB021754

BR-43c616961 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：未列明

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：中熟；株型：中间型；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：中间型；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第108页 原图／官方图页

RB034045

BR-20a795235 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFG

亲本：SP71-5181 × SP80-1816

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西，具体区域见原目录

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：中间型；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：高。

蔗产量等级：高；株型：中间型；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：高；黑穗病：耐受；褐锈病：中间型；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第123页 原图／官方图页

RB036066

BR-16cb427a9 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：SP70-1143 × SP77-5181

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第122页 原图／官方图页

RB036088

BR-fd5090daf | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB855595 × ？

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西，具体区域见原目录

图片：官方品种图页入口

熟期：晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第121页 原图／官方图页

RB036091

BR-e49aa408e | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB855589 × ？

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西，具体区域见原目录

图片：官方品种图页入口

熟期：中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第120页 原图／官方图页

RB036152

BR-7e4af7b1d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：SP83-5073 × RB867515

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第107页 原图／官方图页

RB041443

BR-cbd7720bd | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB805203 × ?

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第106页 原图／官方图页

RB0442

BR-77584ffd7 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB72910 × RB931013

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：中间型；褐锈病：中间型；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：原产区未见（非免疫证明）。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第105页 原图／官方图页

RB045836

BR-5d5d0796c | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB935943 × ?

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：特早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：特早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第93页 原图／官方图页

RB055464

BR-1426e37d2 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：SP83-2847 × RB855206

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中抗；褐锈病：抗；橙锈病：中间型；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第92页 原图／官方图页

RB056351

BR-18815ba21 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB855206 × ？

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第104页 原图／官方图页

RB056380

BR-b996639a2 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB855206 × ？

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第103页 原图／官方图页

RB064292

BR-8d55ed217 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFG

亲本：H64-1881 × ?

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第102页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB066443

BR-ec202d7ea | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB825548 × RB931575

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：中抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第91页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB071055

BR-f8b2bd47e | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB942875 × ?

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第94页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB071071

BR-50c7aab8c | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB863129 × ?

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第88页 原图／官方图页](#)

RB074046

BR-86fae2447 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFG

亲本：RB867515 × RB855046

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中高；纤维含量等级：中高。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中高；纤维含量等级：中高；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第87页 原图／官方图页](#)

RB074067

BR-650564e21 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFG

亲本：F156 × ?

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：中间型；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中高。

蔗产量等级：高；株型：中间型；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中高；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第86页 原图／官方图页](#)

RB075253

BR-0e1ecf2b9 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB855536 × SP77-5181

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第85页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB075322

BR-dc6ba34e4 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB867515 × ？

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB075322蔗茎实物照片；RIDESA，2025目录，PDF第84页。拍摄日期未注明。

熟期：中晚熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：中间型；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · [PDF第84页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB0764

BR-218901d61 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：H61-1881 × RB92579

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：原产区未见（非免疫证明）。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第90页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB076537

BR-229037e59 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：SP70-3370 × RB915079

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：中抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第83页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB077210

BR-d64f5edd7 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：RB988082 × ？

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：中间型。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第82页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB07814

BR-637fcd783 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB9629 × RB92579

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：中间型；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：中间型；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：中间型；叶灼病：耐受；花叶病：原产区未见（非免疫证明）。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第89页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB07818

BR-05e7dcd5a | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB92579 × RB9629

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：原产区未见（非免疫证明）。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第101页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB08791

BR-dc5297bf1 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB951019 × ？

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：原产区未见（非免疫证明）。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第100页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB097217

BR-01cb55b6d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：RB00504 × ？

年份及口径：2023

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第98页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB101130

BR-298e1f51c | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB962975 × ?

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第81页 原图／官方图页](#)

RB106893

BR-caa7b3690 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB957689 × ?

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB106893蔗茎实物照片；RIDESA, 2025目录，PDF第80页。拍摄日期未注明。

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · [PDF第80页 原图／官方图页](#)

RB108519

BR-8b42411ed | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRRJ

亲本：未列明

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第99页 原图／官方图页](#)

RB127825

BR-dc0ead41f | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：RB867515 × CTC14

年份及口径：2023

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第97页 原图／官方图页

RB128519

BR-9437013b6 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRRJ

亲本：CTC14 × RB979088

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB128519蔗茎实物照片；RIDESA, 2025目录，PDF第79页。拍摄日期未注明。

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：中间型；橙锈病：中间型；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · PDF第79页 原图／官方图页

RB70141

BR-c41d6503a | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：未列明

年份及口径：1977

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：未测；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第211页 原图／官方图页

RB70194

BR-c704e6e69 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：？×？

年份及口径：1977

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：未测；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第210页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB705007

BR-3e604af5d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：CP48-110 × ？

年份及口径：1981

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第209页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB705051

BR-67d1aca02 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：？×？

年份及口径：1981

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第208页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB705146

BR-ac2a1fc26 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：CB40-60 × ?

年份及口径：1981

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第207页 原图／官方图页

RB705440

BR-286dcc5a9 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：未列明

年份及口径：1986

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第200页 原图／官方图页

RB7096

BR-bb08965ad | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：CB36-14 × ?

年份及口径：1977

适用／评价区域：巴西东北部

品种实物照片 | RB7096蔗茎实物照片；RIDESA，2025目录，PDF第212页。拍摄日期未注明。

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：未测；叶灼病：感；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · PDF第212页 原图／官方图页

RB721012

BR-52ef76ca7 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：未列明

年份及口径：1986

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：感；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第199页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB72454

BR-b8f4b625f | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：CP53-76 × ？

年份及口径：1982

适用／评价区域：巴西东北部

品种实物照片 | RB72454蔗茎实物照片；RIDESA, 2025目录，PDF第206页。拍摄日期未注明。

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · [PDF第206页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB725147

BR-75468cb67 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：CB63-31 × ？

年份及口径：1982

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第205页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB725828

BR-4acdc180a | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：NA56-79 × ?

年份及口径：1982

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：感；叶灼病：耐受；花叶病：中感。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第204页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB732577

BR-9fddec995 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：未列明

年份及口径：1985

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：未测；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第202页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB735220

BR-7d1acac8d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：CB61-99 × ?

年份及口径：1988

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第196页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB735275

BR-b0babe1ed | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：IAC49-131 × ?

年份及口径：1982

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：高度耐受；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：高度耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第203页 原图／官方图页

RB739359

BR-e751af32d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：未列明

年份及口径：1986

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；叶灼病：抗；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第198页 原图／官方图页

RB739735

BR-4146f3636 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：CB52-179 × ?

年份及口径：1986

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第197页 原图／官方图页

RB75126

BR-24218084e | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：C278 × ?

年份及口径：1993

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第188页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB754665

BR-dccd56dd9 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：CB45-155 × ?

年份及口径：1985

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：耐受；叶灼病：未测；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第201页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB758540

BR-7ecbf7b2 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRRJ

亲本：CB61-122 × ?

年份及口径：1999

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：耐受；叶灼病：抗；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第170页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB763710

BR-e5ec9c108 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：F147 × ?

年份及口径：1996

适用／评价区域：巴西，具体区域见原目录

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第179页 原图／官方图页

RB765418

BR-2e0ec92bf | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：M253/48 × ?

年份及口径：1988

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：半直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第195页 原图／官方图页

RB785148

BR-2572fc8f6 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：Planalsucar

亲本：IAC47-31 × ?

年份及口径：1988

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第194页 原图／官方图页

RB785750

BR-33e9eb689 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：TUC67-11 × ?

年份及口径：1992

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：中等；株型：半倾斜；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第193页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB806043

BR-4edff3cd7 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：NA56-79 × ?

年份及口径：1992

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：感；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第192页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB813804

BR-b60f8d4b1 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：CP48-124 × ?

年份及口径：1996

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：抗；叶灼病：中感；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第178页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB825336

BR-ca9743e97 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：H53-3989 × ?

年份及口径：1992

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：中间型；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：高。

蔗产量等级：高；株型：中间型；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：高；黑穗病：抗；褐锈病：中间型；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第191页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB83102

BR-331be44bf | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：NA56-79 × SP70-1143

年份及口径：1993

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中感；褐锈病：感；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第187页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB83160

BR-db89ee742 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：NA56-79 × SP70-1143

年份及口径：1993

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：中感；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第186页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB83252

BR-4cf45cbec | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：NA56-79 × RB72454

年份及口径：1993

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第185页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB835019

BR-66b25c747 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB72454 × NA56-79

年份及口径：1995

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第183页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB835054

BR-734e971c8 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB72454 × NA56-79

年份及口径：1998

适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB835054蔗茎实物照片；RIDESA，2025目录，PDF第177页。拍摄日期未注明。

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · [PDF第177页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB835089

BR-027e92076 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB72454 × NA56-79

年份及口径：1992

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第190页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB835486

BR-2f3d9629a | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：L60-14 × ？

年份及口径：1992

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：中间型；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：中间型；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：感；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第189页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB83594

BR-3f00c9b2b | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB72454 × B3337

年份及口径：1993

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第184页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB842021

BR-1fe5031 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：B3337 × RB72454

年份及口径：2000

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第168页 原图／官方图页

RB845197

BR-23318a995 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar and UFPR

亲本：RB72454 × SP70-1143

年份及口径：2001

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第165页 原图／官方图页

RB845210

BR-1097543dd | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar and UFPR

亲本：RB72454 × SP70-1143

年份及口径：2001

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第164页 原图／官方图页

RB845257

BR-2c84e379f | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB72454 × SP70-1143

年份及口径：1998

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第176页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB8495

BR-3cec27981 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：SP70-1143 × ?

年份及口径：2000

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第169页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855035

BR-f281f1202 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：L60-14 × SP70-1284

年份及口径：1998

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：耐受；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第175页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855036

BR-1341bd96f | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar and UFPR

亲本：RB72454 × SP70-1143

年份及口径：2001

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第163页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855113

BR-595c61bcb | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：SP70-1143 × RB72454

年份及口径：1998

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第174页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855156

BR-c1d16e8fa | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB72454 × TUC71-7

年份及口径：1995

适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB855156蔗茎实物照片；RIDESEA, 2025目录，PDF第182页。拍摄日期未注明。

熟期：早熟；株型：匍匐；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：中等；株型：匍匐；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · [PDF第182页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855453

BR-b9b92b9f1 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：TUC71-7 × ?

年份及口径：1995

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：很高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：很高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第181页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855463

BR-a5c55ffc1 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB72454 × ?

年份及口径：2000

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：半直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第167页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855511

BR-399a5a3e5 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：SP71-1406 × ?

年份及口径：2000

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：半直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：高度耐受；叶灼病：抗；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第166页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855536

BR-d999a0295 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：SP70-1143 × RB72454

年份及口径：1998

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第173页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855546

BR-d01fda4a7 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：SP70-1143 × RB72454

年份及口径：1998

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第172页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB855563

BR-8cb810f21 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：TUC71-7 × SP70-1143

年份及口径：1995

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：匍匐；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：匍匐；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：耐受；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第180页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB858927

BR-fde34e5fd | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRRJ

亲本：NA56-79 × RB739735

年份及口径：2005

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：半匍匐；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半匍匐；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第157页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB863129

BR-a044ecb0c | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB763411 × ？

年份及口径：2005

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：中感；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第156页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB865230

BR-858b6f2ac | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar and UFPR

亲本：SP70-1143 × RB72454

年份及口径：2001

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第162页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB867515

BR-11ce86efc | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用
育种／来源单位：UFV
亲本：RB72454 × ?
年份及口径：1998
适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB867515蔗茎实物照片；RIDESA，2025目录，PDF第171页。拍摄日期未注明。

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · PDF第171页 原图／官方图页

RB872552

BR-7b7b3d2a6 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB754665 × RB773720

年份及口径：2005

适用／评价区域：巴西东北部

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第155页 原图／官方图页

RB925211

BR-0cfc28371 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB855206 × ?

年份及口径：2006

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中高。

蔗产量等级：中高；株型：半倾斜；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中高；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第151页 原图／官方图页

RB925268

BR-a8f8fd14e | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB855511 × ?

年份及口径：2006

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：感。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第150页 原图／官方图页

RB925345

BR-9e7d0c265 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：H59-1966 × ?

年份及口径：2006

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：高。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：高；黑穗病：感；褐锈病：感；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第149页 原图／官方图页

RB92579

BR-d995f1229 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB75126 × RB72199

年份及口径：2003

适用／评价区域：巴西东北部

品种实物照片 | RB92579蔗茎实物照片；RIDESA，2025目录，PDF第160页。拍摄日期未注明。

熟期：中晚熟；株型：半匍匐；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半匍匐；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中间型；褐锈病：耐受；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · PDF第160页 原图／官方图页

RB928064

BR-a79953788 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：SP70-1143 × ?

年份及口径：2001

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第161页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB931003

BR-70e182509 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB72454 × RB835089

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第147页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB931011

BR-cb31e36ba | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB83160 × RB72454

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第146页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB931530

BR-f43744fdb | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：Q107 × ?

年份及口径：2003

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第158页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB932520

BR-796c56084 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：SP71-1406 × ?

年份及口径：2005

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：耐受；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第154页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB93509

BR-19523797d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB72454 × ?

年份及口径：2003

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本 “?” 表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第159页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB935744

BR-f48584318 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB835089 × RB765418

年份及口径：2006

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第148页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB937570

BR-f2ce07bf8 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：RB72454 × SP70-1143

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：中感。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第145页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB943047

BR-b570a21dd | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB855106 × ？

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：中高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：中间型；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第119页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB943365

BR-bbf9e09c8 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：ROC3 × RB83100

年份及口径：2005

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：未测；褐锈病：中感；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第153页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB943538

BR-71c842b41 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：RB775035 × ？

年份及口径：2005

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：中感；叶灼病：中感；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第152页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB946903

BR-fae575207 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB765418 × RB72454

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第144页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB951541

BR-4c44b7547 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB72454 × SP79-1011

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图网页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中等；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第143页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB956911

BR-1b498dfc9 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB855206 × RB855035

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图网页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：中感；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第142页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB961003

BR-734c2ed0d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：未列明

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图网页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：原产区未见（非免疫证明）。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第118页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB961552

BR-ecc6c039d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：B4362 × IAC68/12

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：中间型；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第134页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB962962

BR-e2b81339d | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：R397 × ？

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：未测；褐锈病：中感；叶灼病：未测；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第141页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB965902

BR-e86644f31 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB855536 × RB855453

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB965902蔗茎实物照片；RIDESA，2025目录，PDF第140页。拍摄日期未注明。

熟期：中熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · [PDF第140页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB965917

BR-4275deca9 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB855453 × RB855536

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第139页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB966928

BR-bc7bba197 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFPR

亲本：RB855156 × RB815690

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB966928蔗茎实物照片；RIDESA, 2025目录，PDF第138页。拍摄日期未注明。

熟期：早熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · [PDF第138页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB969017

BR-141af7d93 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRRJ

亲本：未列明

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：中间型。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第133页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB975033

BR-8d9b00125 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）



育成来源：巴西；用途：糖用
育种／来源单位：UFSCar
亲本：RB855206 × SP80-185
年份及口径：2021
适用／评价区域：巴西中南部

品种实物照片 | RB975033蔗茎实物照片；RIDESA，2025目录，PDF第117页。拍摄日期未注明。

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

来源：BR-D04 · PDF第117页 [原图](#)／[官方图页](#)

RB975201

BR-ddbff19bd | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用
育种／来源单位：UFSCar
亲本：RB855113 × ?
年份及口径：2015
适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：中高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第132页 [原图](#)／[官方图页](#)

RB975242

BR-93a5b1bd6 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用
育种／来源单位：UFSCar
亲本：F147 × ?
年份及口径：2015
适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：中抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第131页 [原图](#)／[官方图页](#)

RB975375

BR-f06a53e4b | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB855035 × RB855536

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西，具体区域见原目录

图片：官方品种图页入口

熟期：早中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第116页 原图／官方图页

RB975952

BR-92e48d0eb | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：RB835486 × RB825548

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：早熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：中间型；叶灼病：抗；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第130页 原图／官方图页

RB977526

BR-a2b304f6a | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：RB83102 × RB855002

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第96页 原图／官方图页

RB985476

BR-143d3403a | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFSCar

亲本：H53-3989 × RB855206

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第129页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB98710

BR-59d1d3fcf | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：SP81-3250 × RB93509

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：中感；褐锈病：抗；叶灼病：中感；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第137页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB987917

BR-02a3ffdd1 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：RB72454 × ？

年份及口径：2021

适用／评价区域：巴西中南部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：中高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“？”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第115页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB987935

BR-cc522ee3f | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：未列明

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第128页 原图／官方图页

RB988082

BR-72cd99131 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFV

亲本：RB83102 × RB72454

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：耐受；褐锈病：耐受；橙锈病：耐受；叶灼病：耐受；花叶病：耐受。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第127页 原图／官方图页

RB991532

BR-60d7a35a9 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB75126 × RB855536

年份及口径：2025

适用／评价区域：巴西中南部

图片：官方品种图页入口

熟期：中晚熟；株型：直立；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中晚熟；蔗糖含量等级：中等；纤维含量等级：中等；黑穗病：抗；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：耐受；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · PDF第95页 原图／官方图页

RB991536

BR-52f6786cb | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB739359 × ?

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：中熟；株型：直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：直立；熟期：中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；橙锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第126页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB992506

BR-7ac2364b6 | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFRPE

亲本：未列明

年份及口径：2015

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早中熟；株型：半直立；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等。

蔗产量等级：高；株型：半直立；熟期：早中熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：中等；黑穗病：中间型；褐锈病：抗；橙锈病：中间型；叶灼病：中间型；花叶病：抗。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第125页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

RB99395

BR-9e5ddf6bb | 性状档案 | 历年发布品种（2025目录收录）

育成来源：巴西；用途：糖用

育种／来源单位：UFAL

亲本：RB867515 × ?

年份及口径：2010

适用／评价区域：巴西东北部

图片：[官方品种图页入口](#)

熟期：早熟；株型：半倾斜；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低。

蔗产量等级：高；株型：半倾斜；熟期：早熟；蔗糖含量等级：高；纤维含量等级：低；黑穗病：中感；褐锈病：抗；叶灼病：抗；花叶病：未测。

核查说明：性状为目录中的地区评级；发布年份不代表现今主栽地位。父本“?”表示原目录未确定，不改写为自交。

待补：品种实物照片

来源：BR-D04 · [PDF第136页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

印度 | 品种与材料档案

61条记录 · 核查日期2026-09-29

包括PPV&FR官方登记资料中的甘蔗名称以及Co系列近期官方发布、试验和许可材料。登记日期与发布日期分开理解；CoLk、CoPant、CoM等系列仍有缺口。

Co 0124

IN-07eaaa1c1 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Karan 5 (Co 0124)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Karan 5 (Co 0124)，类别为既有品种；证书号172 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：172 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 0237

IN-e7827e466 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：19 August 2016（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Co 0237

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Co 0237，类别为新品种；证书号262 of 2016。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：262 of 2016。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 0403

IN-97d298bb7 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：19 August 2016（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Co 0403

图片：官方品种图文页入口

PPV&FR公示名为Co 0403，类别为新品种；证书号260 of 2016。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：260 of 2016。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP [原图](#)／[官方图页](#)

Co 05011

IN-09fd6e4b7 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：19 August 2016（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：KARAN 9 (Co 05011)

图片：官方品种图文页入口

PPV&FR公示名为KARAN 9 (Co 05011)，类别为新品种；证书号261 of 2016。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：261 of 2016。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP 原图／官方图页

Co 11015

IN-944cdcdf3 | 性状档案 | 已发布

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：ICAR-Sugarcane Breeding Institute

亲本：CoC 671 × Co 86011

年份及口径：2022

适用／评价区域：印度半岛区；具体州别见原说明

图片：尚缺可确认的品种照片

早熟，可在8至12个月收获，宿根较好，适用于印度半岛区及特定季节种植。不同站点和多点试验产量应分别记录。

核查说明：保留正式发布、候选试验和技术许可三种不同身份。

待补：品种实物照片

来源：IN-D04

Co 1148

IN-9321853ac | 性状摘要 | 境外引进栽培记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：SBI India

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：肯尼亚（此来源评价地）

图片：尚缺可确认的品种照片

印度SBI来源；肯尼亚1998年推广记录，成熟期20至22个月，蔗产量较高。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第19页

Co 14005

IN-0ccd4ea92 | 性状档案 | 已发布

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：ICAR-Sugarcane Breeding Institute

亲本：Co 86032 × Co 86011

年份及口径：2023

适用／评价区域：印度半岛区；具体州别见原说明

图片：尚缺可确认的品种照片

中晚熟，半岛区适用；原机构报告在Kolhapur积水条件下表现较好，并报告赤腐、黑穗和黄叶病抗性。

核查说明：保留正式发布、候选试验和技术许可三种不同身份。

待补：品种实物照片

来源：IN-NEW

Co 14012

IN-8033c0613 | 性状档案 | 已发布

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：ICAR-Sugarcane Breeding Institute

亲本：Co 86032 × Co 86011

年份及口径：2022

适用／评价区域：印度半岛区；具体州别见原说明

图片：官方品种图文页入口

中晚熟，面向印度半岛区；黑穗病和黄叶病反应较好，赤腐病结果须区分节接种与插芯接种法。

核查说明：保留正式发布、候选试验和技术许可三种不同身份。

待补：品种实物照片

来源：IN-NEW [原图](#)／[官方图页](#)

Co 18003

IN-a30b7c38b | 性状档案 | 试验克隆／发布待核

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：ICAR-Sugarcane Breeding Institute

亲本：未列明

年份及口径：2023至2025（试验）

适用／评价区域：印度半岛区；具体州别见原说明

图片：尚缺可确认的品种照片

ICAR-SBI列为经AICRP筛选的新克隆，糖产量表现较好；本版不把鉴定或参试自动当作正式发布。

核查说明：保留正式发布、候选试验和技术许可三种不同身份。

待补：亲本、品种实物照片

来源：IN-NEW

Co 18009

IN-6f4b0fcca | 性状档案 | 已发布

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：ICAR-Sugarcane Breeding Institute

亲本：Co 07027 × ISH 69

年份及口径：2023

适用／评价区域：印度半岛区；具体州别见原说明

图片：官方品种图文页入口

中晚熟，Tamil Nadu灌溉条件适用；宿根、耐旱及机收适应性较好，赤腐病中抗。

核查说明：保留正式发布、候选试验和技术许可三种不同身份。

待补：品种实物照片

来源：IN-NEW [原图](#)／[官方图页](#)

Co 19009

IN-d2e72d0a5 | 性状档案 | 优良试验材料／发布待核

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：ICAR-Sugarcane Breeding Institute

亲本：未列明

年份及口径：2023至2025（试验）

适用／评价区域：印度半岛区；具体州别见原说明

图片：尚缺可确认的品种照片

面向Tamil Nadu和Puducherry的中晚熟候选材料；赤腐病节接种与插芯接种评价不同。

核查说明：保留正式发布、候选试验和技术许可三种不同身份。

待补：亲本、品种实物照片

来源：IN-NEW

Co 21003

IN-3bc31b91a | 性状档案 | 优良试验材料／发布待核

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：ICAR-Sugarcane Breeding Institute

亲本：未列明

年份及口径：2023至2025（试验）

适用／评价区域：印度半岛区；具体州别见原说明

图片：官方品种图文页入口

机构与产业联合试验中表现较好的中晚熟材料，宿根较好；地方适用性和正式公告应独立核对。

核查说明：保留正式发布、候选试验和技术许可三种不同身份。

待补：亲本、品种实物照片

来源：IN-NEW 原图／官方图页

Co 421

IN-233fa8b90 | 性状摘要 | 境外引进栽培记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：SBI India

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：肯尼亚（此来源评价地）

图片：尚缺可确认的品种照片

印度SBI来源；肯尼亚20世纪50年代推广记录，成熟期20至22个月，适应性较广。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第19页

Co 617

IN-763e534d7 | 性状摘要 | 境外引进栽培记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：SBI India

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：肯尼亚（此来源评价地）

图片：尚缺可确认的品种照片

印度SBI来源；肯尼亚20世纪50年代推广记录，成熟期18至20个月，耐逆境。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第19页

Co 8371

IN-0b0acfd11 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Bhima (Co 8371)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Bhima (Co 8371)，类别为既有品种；证书号165 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：165 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 85004

IN-8baf6efe3 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Prabha (Co 85004)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Prabha (Co 85004)，类别为既有品种；证书号170 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：170 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 86032

IN-d1c3f1e86 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Nayana (Co 86032)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Nayana (Co 86032)，类别为既有品种；证书号164 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：164 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 86249

IN-64d2446cd | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Bhavani (Co 86249)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Bhavani (Co 86249)，类别为既有品种；证书号167 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：167 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 87025

IN-d2eb76a7d | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Kalyani (Co 87025)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Kalyani (Co 87025)，类别为既有品种；证书号163 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：163 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 87044

IN-da5d50855 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Uttara (Co 87044)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Uttara (Co 87044)，类别为既有品种；证书号168 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：168 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 87263

IN-ccb6761ca | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Sarayu (Co 87263)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Sarayu (Co 87263)，类别为既有品种；证书号169 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：169 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 87268

IN-d59f91f67 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Moti (Co 87268)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Moti (Co 87268)，类别为既有品种；证书号166 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：166 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 89029

IN-4417791dc | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Gandak (Co 89029)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Gandak (Co 89029)，类别为既有品种；证书号171 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：171 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 91010

IN-f36644e1e | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Dhanush (Co 91010)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Dhanush (Co 91010)，类别为既有品种；证书号162 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：162 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 94008

IN-35b9cdd8f | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 October 2012（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Shyama (Co 94008)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Shyama (Co 94008)，类别为既有品种；证书号172 of 2012。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：172 of 2012。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 945

IN-400a661f2 | 性状摘要 | 境外引进栽培记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：SBI India

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：肯尼亚（此来源评价地）

图片：尚缺可确认的品种照片

印度SBI来源；肯尼亚1998年推广记录，成熟期18至20个月，较高糖分。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第19页

Co 98014

IN-91be22e02 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：KARAN-1 (Co 98014)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为KARAN-1 (Co 98014)，类别为既有品种；证书号164 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：164 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co 99004

IN-e2e3bfa2d | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：12 September 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：DAMODAR (Co 99004)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为DAMODAR (Co 99004)，类别为既有品种；证书号145 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：145 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co Pant 97222

IN-faef06f74 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 May 2014（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Co Pant 97222

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Co Pant 97222，类别为既有品种；证书号150 of 2014。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：150 of 2014。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co Pant-90223

IN-ec911e94b | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Co Pant-90223

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Co Pant-90223，类别为既有品种；证书号169 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：169 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co- 0118

IN-52bc997ca | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：19 August 2016（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：KARAN-2(Co- 0118)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为KARAN-2(Co- 0118)，类别为新品种；证书号227 of 2016。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：227 of 2016。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co-0218

IN-185bb8b5d | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Co-0218

图片：官方品种图文页入口

PPV&FR公示名为Co-0218，类别为既有品种；证书号171 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：171 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP [原图](#)／[官方图页](#)

Co-0232

IN-ffb522059 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Co-0232

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Co-0232，类别为既有品种；证书号163 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：163 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co-0233

IN-34fbf569c | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：30 December 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Co-0233

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Co-0233，类别为既有品种；证书号295 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：295 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co-0238

IN-abd56687a | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：04 October 2017（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：CO-0238

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为CO-0238，类别为新品种；证书号281 of 2017。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：281 of 2017。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co-2001-13

IN-8f11eadca | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Sulabh (Co-2001-13)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Sulabh (Co-2001-13)，类别为既有品种；证书号165 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：165 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co-2001-15

IN-d127c1417 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Co-2001-15

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Co-2001-15，类别为既有品种；证书号162 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：162 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Co-94012

IN-824e60a21 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：12 September 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：CO-94012

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为CO-94012，类别为既有品种；证书号144 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：144 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoC 01-061

IN-a67601115 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：16 December 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：CoC(SC)23 (CoC 01-061)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为CoC(SC)23 (CoC 01-061)，类别为既有品种；证书号270 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：270 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoH 119

IN-1bc33ab75 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：CoH 119 (Haryana Ganna-119)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为CoH 119 (Haryana Ganna-119)，类别为既有品种；证书号166 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：166 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoH 92201

IN-b0d032da5 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Haryana-92 (CoH 92201)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Haryana-92 (CoH 92201)，类别为既有品种；证书号160 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：160 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoJ 89

IN-00200801f | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：COJ 89

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为COJ 89，类别为既有品种；证书号157 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：157 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoJ-84

IN-28b05a1b7 | 性状档案 | 受限／禁种历史记录



育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：印度育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CoJ-84：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。

快速生长、宿根较强；旁遮普曾于2000年推广，后因低糖晚熟被禁止商业种植，原站仍记录有种植。

待补：亲本、育成／发布年份

来源：PK-X039 原图／官方图页

CoLK 94184

IN-988eec24f | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：10 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Birendra (CoLK 94184)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Birendra (CoLK 94184)，类别为既有品种；证书号183 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：183 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoM 7714

IN-b8864147d | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：CoM 7714 (Krishna)/CoM-88121

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为CoM 7714 (Krishna)/CoM-88121，类别为既有品种；证书号161 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：161 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoN 03131

IN-2b8b0faed | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Navsari Agricultural University

亲本：未列明

年份及口径：28 March 2018（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Gujrat Sugarcane-4 (CoN 03131)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Gujrat Sugarcane-4 (CoN 03131)，类别为既有品种；证书号57 of 2018。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：57 of 2018。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoN 04131

IN-d2cef661c | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Navsari Agricultural University

亲本：未列明

年份及口径：28 March 2018（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Gujrat Sugarcane-7 (CoN 04131)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Gujrat Sugarcane-7 (CoN 04131)，类别为既有品种；证书号56 of 2018。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：56 of 2018。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoN 05071

IN-bab353821 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体： Navsari Agricultural University

亲本：未列明

年份及口径：28 March 2018（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Gujrat Sugarcane-5 (CoN 05071)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Gujrat Sugarcane-5 (CoN 05071)，类别为既有品种；证书号60 of 2018。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：60 of 2018。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoN 05072

IN-395999e2f | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体： Navsari Agricultural University

亲本：未列明

年份及口径：28 March 2018（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Gujrat Sugarcane-6 (CoN 05072)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Gujrat Sugarcane-6 (CoN 05072)，类别为既有品种；证书号58 of 2018。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：58 of 2018。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoN 07072

IN-f0a26f571 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体： Navsari Agricultural University

亲本：未列明

年份及口径：28 March 2018（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Gujrat Sugarcane-8 (CoN 07072)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Gujrat Sugarcane-8 (CoN 07072)，类别为既有品种；证书号59 of 2018。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：59 of 2018。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoS 91230

IN-ae57db39c | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Raseeli (CoS 91230)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Raseeli (CoS 91230)，类别为既有品种；证书号170 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：170 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoS 94270

IN-5503735bc | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Sweta (COS 94270)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Sweta (COS 94270)，类别为既有品种；证书号156 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：156 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoS 96268

IN-91c3b5e5a | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Mithas (COS 96268)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Mithas (COS 96268)，类别为既有品种；证书号159 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：159 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoS 96275

IN-60d5c9e9f | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Sweety (CoS 96275)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Sweety (CoS 96275)，类别为既有品种；证书号173 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：173 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoSe 92423

IN-bd5d4238f | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Rajbhog (CoSe 92423)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Rajbhog (CoSe 92423)，类别为既有品种；证书号158 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：158 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoSE 95422

IN-35a4297a1 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Rasbhari (CoSE 95422)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Rasbhari (CoSE 95422)，类别为既有品种；证书号168 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：168 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoSe 96434

IN-7b3eb807c | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：CoSe 96434 (Jalpari)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为CoSe 96434 (Jalpari)，类别为既有品种；证书号174 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：174 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Cose-95255

IN-3daa50c48 | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：07 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Cose-95255 (Rachana)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Cose-95255 (Rachana)，类别为既有品种；证书号155 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：155 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

CoVSI-9805

IN-91702725a | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Vasantdada Sugar Institute

亲本：未列明

年份及口径：31 December 2015（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：CoVSI-9805

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为CoVSI-9805，类别为既有品种；证书号278 of 2015。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：278 of 2015。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

Pramod (B.O. 128)

IN-556c5203d | 名称／身份 | 品种权登记记录

育成来源：印度；用途：糖用

育种／来源单位：登记申请主体：Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

亲本：未列明

年份及口径：08 October 2013（登记）

适用／评价区域：原始推广区待核

别名：Pramod (B.O. 128)

图片：尚缺可确认的品种照片

PPV&FR公示名为Pramod (B.O. 128)，类别为既有品种；证书号167 of 2013。该来源用于确认名称和权利登记，未据此推定农艺优劣。

证书号：167 of 2013。

核查说明：品种权登记时间不等于育成或农业推广发布时间；期限以主管机构为准。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：IN-PVP

SBIEC 14006

IN-5e90c9c26 | 性状档案 | 能源蔗许可材料

育成来源：印度；用途：能源／生物量

育种／来源单位：ICAR-Sugarcane Breeding Institute

亲本：未列明

年份及口径：2024（许可）

适用／评价区域：印度半岛区；具体州别见原说明

图片：尚缺可确认的品种照片

II型能源蔗，以生物量为主要育种目标。机构记录已进行技术许可；其低汁液糖度不适合直接按普通糖用品种评价。

核查说明：保留正式发布、候选试验和技术许可三种不同身份。

待补：亲本、品种实物照片

来源：IN-NEW

澳大利亚 | 品种与材料档案

52条记录 · 核查日期2026-09-29

主体为SRA 2024种植调查列出的品种名称，另补2025年SRAW46、SRA47与SRA48资料。调查出现名称仅证明被统计，不代表完整国家登记册；SRA47保留暂定发布状态。

KQ228

AU-757342bc6 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核
育成来源：澳大利亚；用途：糖用
育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）
亲本：未列明
年份及口径：2024（调查）
适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）
图片：尚缺可确认的品种照片
SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。
待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：AU-SURVEY

Q124

AU-fbfeb5ef9 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核
育成来源：澳大利亚；用途：糖用
育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）
亲本：未列明
年份及口径：2024（调查）
适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）
图片：尚缺可确认的品种照片
SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。
待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：AU-SURVEY

Q183

AU-38ec5ae8d | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核
育成来源：澳大利亚；用途：糖用
育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）
亲本：未列明
年份及口径：2024（调查）
适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）
图片：尚缺可确认的品种照片
SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。
待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：AU-SURVEY

Q200

AU-85a62b3d8 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q204

AU-28a2f9737 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q208

AU-ccd31fce4 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q219

AU-25d9d4e7f | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q231

AU-4dd385051 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q232

AU-5d4445bed | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q240

AU-5cf151191 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q253

AU-d1aa41dad | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q254

AU-08de9195a | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

Q288

AU-b0f04e604 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA10

AU-f7aa9c057 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA11

AU-907da91d0 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA14

AU-f4458d5b4 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA15

AU-f37ad71f5 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA16

AU-7ca64f894 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA19

AU-9866e09d9 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA2

AU-d41aa07a6 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA20

AU-b0343e525 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA21

AU-e99a50b03 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA22

AU-b3260d19a | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA23

AU-9dbf02a2f | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA26

AU-d11a70956 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA27

AU-cdd3a5c0a | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA28

AU-703f4cfca | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA29

AU-8bbc980ef | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA3

AU-407e809d7 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA30

AU-8d3d25179 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA31

AU-ab8143543 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA32

AU-8842f2dc3 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA33

AU-6b8d28a75 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA34

AU-272dee5be | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA35

AU-2d4e7bd9b | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA36

AU-3ee4f6601 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA37

AU-71c652382 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA38

AU-b68e1e688 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA39

AU-12dcedba2 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA4

AU-6576b79a7 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA40

AU-d9c3f17c7 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA41

AU-b178e62ee | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA43

AU-5734e92e3 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA44

AU-e93aa4181 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA45

AU-d608faa6d | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA47

AU-30603029e | 性状／发布摘要 | 2025暂定发布

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：Sugar Research Australia及协作单位

亲本：未列明

年份及口径：2025

适用／评价区域：Southern

图片：尚缺可确认的品种照片

南部区域暂定发布，仍待更多病害数据；Pachymetra根腐病风险限制适用地。

待补：亲本、品种实物照片

来源：AU-SPRING

SRA48

AU-9f707d7c7 | 性状／发布摘要 | 2025区域批准

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：Sugar Research Australia及协作单位

亲本：未列明

年份及口径：2025

适用／评价区域：Herbert

图片：尚缺可确认的品种照片

蔗产量优势可部分抵消CCS略低；较直立、萌芽可靠，需避免高Pachymetra孢子量地块。

待补：亲本、品种实物照片

来源：AU-SPRING

SRA5

AU-745518848 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA6

AU-2566ad986 | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA7

AU-d41ea270c | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRA9

AU-554084cca | 名称／身份 | 调查出现名称，发布状态待核

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：澳大利亚SRA／前身及协作育种体系（逐品种待核）

亲本：未列明

年份及口径：2024（调查）

适用／评价区域：澳大利亚（具体区域待核）

图片：尚缺可确认的品种照片

SRA 2024种植者调查中出现的品种名称。该调查反映受访者的扩种意向，属于身份线索；尚须区域品种指南核对发布状态、抗性和适宜区域。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：AU-SURVEY

SRAW46

AU-c9c0daa74 | 性状／发布摘要 | 2025区域批准

育成来源：澳大利亚；用途：糖用

育种／来源单位：Sugar Research Australia及协作单位

亲本：未列明

年份及口径：2025

适用／评价区域：Burdekin

图片：尚缺可确认的品种照片

生长较旺、较直立，叶鞘附着较松；不同地区的抽穗表现不同。

待补：亲本、品种实物照片

来源：AU-SPRING

美国（含波多黎各） | 品种与材料档案

15条记录 · 核查日期2026-09-29

合并Canal Point及波多黎各相关材料的官方研究、品种资料与境外引种档案。远未覆盖美国所有CP、L、Ho、PR等系列，境外试验表现不能替代美国本地推荐。

CP 03-1912

US-d89f78322 | 性状档案 | 已发布品种



育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：USDA-ARS Canal Point／UF-IFAS／Florida Sugar Cane League；CPCL杂交在Clewiston
亲本：CP 92-1167 × CP 95-1039
年份及口径：June 2011
适用／评价区域：美国佛罗里达；沙土

品种实物照片 | CP 03-1912：UF/IFAS原文鉴别实物图。摄影／供图：Wayne Davidson, Florida Sugar Cane League（据原图署名）。
沙土适用品种，蔗产量较高、抗褐锈和橙锈；糖分中等，耐冻弱并感黄叶病毒。

来源：US-X075 原图／官方图页

CP 06-2042

US-2767796dc | 性状档案 | 已发布品种




育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：USDA-ARS Canal Point／UF-IFAS／Florida Sugar Cane League；CPCL杂交在Clewiston
亲本：CP 96-1252 × 01 P 04
年份及口径：2014
适用／评价区域：美国佛罗里达；有机土及沙土

品种实物照片 | CP 06-2042：UF/IFAS原文鉴别实物图。摄影／供图：Wayne Davidson, Florida Sugar Cane League（据原图署名）。
有机土和沙土均可利用，早期糖分较高；感橙锈病及黄叶病，耐冻较弱。

来源：US-SC106 原图／官方图页

CP 06-2400

US-bc43ca379 | 性状档案 | 已发布品种



育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：USDA-ARS Canal Point／UF-IFAS／Florida Sugar Cane League；CPCL杂交在Clewiston
亲本：CP 94-1100 × 03 P 29
年份及口径：2013
适用／评价区域：美国佛罗里达；有机土

品种实物照片 | CP 06-2400：UF/IFAS原文鉴别实物图。摄影／供图：Wayne Davidson, Florida Sugar Cane League（据原图署名）。
适用于有机土，抗褐锈、黑穗和花叶病；湿地萌芽较差，宿根矮化病及黄叶病是限制。

来源：US-SC106 原图／官方图页

CP 07-2137

US-00ed9d84f | 性状档案 | 已发布品种



育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：USDA-ARS Canal Point／UF-IFAS／Florida Sugar Cane League；CPCL杂交在Clewiston
亲本：CP 01-2390 × CP 84-1198
年份及口径：2014
适用／评价区域：美国佛罗里达；沙土

品种实物照片 | CP 07-2137：UF/IFAS原文鉴别实物图。摄影／供图：Wayne Davidson, Florida Sugar Cane League（据原图署名）。

面向沙土，高蔗产量和糖分、抗橙锈病；需关注黑穗病、黄叶病及花叶病。

来源：US-SC106 原图／官方图页

CP 77-400

US-9799af357 | 性状档案 | 引进栽培记录



育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：美国Canal Point合作育种体系
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CP 77-400：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。

1990年由美国USDA-ARS Canal Point引入巴基斯坦；较粗茎。本条保留美国育成与巴基斯坦引种的区别。

待补：亲本、育成／发布年份

来源：PK-X054 原图／官方图页

CPCL 00-4111

US-924452d09 | 性状档案 | 退出主要品种名单



育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：USDA-ARS Canal Point／UF-IFAS／Florida Sugar Cane League；CPCL杂交在Clewiston
亲本：'CL 83-3431' × 'CL 89-5189'
年份及口径：2010
适用／评价区域：美国佛罗里达；有机土

品种实物照片 | CPCL 00-4111：UF/IFAS原文鉴别实物图。摄影／供图：Wayne Davidson, Florida Sugar Cane League（据原图署名）。

原为有机土发布品种，蔗产量较高；感黑穗、叶灼和宿根矮化病，2024普查已退出主要品种名单。

来源：US-SC103 原图／官方图页

CPCL 02-6848

US-f645688ac | 性状档案 | 因病害主要留作试验



育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：USDA-ARS Canal Point／UF-IFAS／Florida Sugar Cane League；CPCL杂交在Clewiston
亲本：CL 92-2533 × Poly 01-9
年份及口径：2012
适用／评价区域：美国佛罗里达；有机土及沙土

品种实物照片 | CPCL 02-6848：UF/IFAS原文鉴别实物图。摄影／供图：Wayne Davidson, Florida Sugar Cane League（据原图署名）。

2012年面向有机土及沙土发布，宿根表现较好；因橙锈病问题面积锐减，现主要保留试验用途。

来源：US-SC104 原图／官方图页

CPCL 05-1201

US-476d577af | 性状档案 | 已发布品种



育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：USDA-ARS Canal Point／UF-IFAS／Florida Sugar Cane League；CPCL杂交在Clewiston
亲本：CL 87-2882 × CL 93-2679
年份及口径：2012
适用／评价区域：美国佛罗里达；有机土及沙土

品种实物照片 | CPCL 05-1201：UF/IFAS原文鉴别实物图。摄影／供图：Wayne Davidson, Florida Sugar Cane League（据原图署名）。
适用于有机土和沙土，蔗产量较高、多种病害反应较好；有机土含糖偏低，较适合后季收获。
来源：US-SC104 原图／官方图页

CPCL 97-2730

US-e97b680f4 | 性状档案 | 退出主要品种名单



育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：USDA-ARS Canal Point／UF-IFAS／Florida Sugar Cane League；CPCL杂交在Clewiston
亲本：'CL 75-0853' × 'CL 88-4730'
年份及口径：2008
适用／评价区域：美国佛罗里达；沙土

品种实物照片 | CPCL 97-2730：UF/IFAS原文鉴别实物图。摄影／供图：Wayne Davidson, Florida Sugar Cane League（据原图署名）。
原为沙土发布品种，晚种萌芽和茎数偏低；2024普查已退出主要品种名单。
来源：US-SC103 原图／官方图页

Ho 13-739

US-69463882f | 性状档案 | 2026推广评价收录

育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：LSU AgCenter／USDA-ARS／American Sugar Cane League合作体系
亲本：Ho 06-9610 × HoCP 04-838
年份及口径：2020
适用／评价区域：美国路易斯安那
图片：尚缺可确认的品种照片
早熟高糖、较粗茎，沙质土表现较好；老宿根糖产量是主要限制。
待补：品种实物照片
来源：US-2026

HoL 15-508

US-7e09912d7 | 性状档案 | 2026推广评价收录

育成来源：美国；用途：糖用
育种／来源单位：LSU AgCenter／USDA-ARS／American Sugar Cane League合作体系
亲本：CP 83-644 × L 01-283
年份及口径：2022
适用／评价区域：美国路易斯安那
图片：尚缺可确认的品种照片
早熟高糖、宿根较好，冠层覆盖较好；耐寒较弱，感蔗茎螟虫。
待补：品种实物照片
来源：US-2026

L 14-267

US-1a34795a8 | 性状档案 | 2026推广评价收录

育成来源：美国；用途：糖用

育种／来源单位：LSU AgCenter／USDA-ARS／American Sugar Cane League合作体系

亲本：HoCP 05-918 × L 01-283

年份及口径：2021

适用／评价区域：美国路易斯安那

图片：尚缺可确认的品种照片

较粗重茎、含糖较高；株型直立但行间遮阴差，杂草管理要求较高。

待补：品种实物照片

来源：US-2026

L 15-306

US-bab51568b | 性状档案 | 2026推广评价收录

育成来源：美国；用途：糖用

育种／来源单位：LSU AgCenter／USDA-ARS／American Sugar Cane League合作体系

亲本：CP 83-644 × L 01-283

年份及口径：2022

适用／评价区域：美国路易斯安那

图片：尚缺可确认的品种照片

中熟，茎数多、宿根较好，耐旱表现较好；对蔗茎螟虫很敏感。

待补：品种实物照片

来源：US-2026

PR 61-632

US-defa08a5d | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：美国（波多黎各育成；哥伦比亚试验）；用途：糖用

育种／来源单位：原目录品种来源机构（待细核）

亲本：PR 56-287 × M 336

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区



品种实物照片 | PR 61-632蔗茎／节部鉴别实物图；Cenicaña《Catálogo de variedades》第二版（2003）。图片为历史档案。

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间、节间略弯曲。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

来源：CO-CAT · PDF第80页 原图／官方图页

UFCP 74-1010

US-1a1acffbba | 性状档案 | 能源蔗说明收录

育成来源：美国；用途：能源／纤维

育种／来源单位：UF／Canal Point合作体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：佛罗里达有机土及沙土

图片：尚缺可确认的品种照片

能源蔗，原表纤维含量约22.38%，茎高约335.8厘米；评价目标是纤维／生物量，不能按糖用品种的含糖要求判断。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：US-SC113

南非 | 品种与材料档案

63条记录 · 核查日期2026-09-29

收录本轮取得的63份SASRI独立品种档案。遵照图片使用限制保留官方品种图页入口，不把无关甘蔗田照片充作品种图片；资料收录不等于当前所有地区都推荐种植。

N12

ZA-f8e6ab2a8 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录
育成来源：南非；用途：糖用
育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：南非；分区见说明
图片：官方品种图页入口
适用于雨养区多种土壤和较长收获周期；耐旱表现稳定，萌芽和封行慢，不适合12个月收获制。
核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片
来源：ZA-N12 原图／官方图页

N12 Zapyr

ZA-f6eba652e | 性状档案 | SASRI品种信息表收录
育成来源：南非；用途：糖用
育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：南非；分区见说明
图片：官方品种图页入口
由N12诱变育成的耐咪唑烟酸变异品种，农艺基础接近N12；适用于雨养长周期，耐除草剂特性具有特定使用条件。
核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片
来源：ZA-N12-Zapyr 原图／官方图页

N14

ZA-4d2ba1dbb | 性状档案 | SASRI品种信息表收录
育成来源：南非；用途：糖用
育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：南非；分区见说明
图片：官方品种图页入口
适用于中高生产潜力土壤和灌溉条件；较抗倒伏，蔗糖含量偏低，受水分胁迫后恢复较差。
核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片
来源：ZA-N14 原图／官方图页

N16

ZA-d50795b14 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于内陆和中部高地区腐殖质土、红壤及长周期；不适合浅沙土和积水地，需关注锈病。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N16 原图／官方图页

N17

ZA-dabddf8c5 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于排水良好的沙土至砂质黏壤土；较耐干旱，应安排春夏种植和中后期收获，低温湿地表现差。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N17 原图／官方图页

N19

ZA-e9cefaf10 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于较高潜力土壤的一年收获制；含糖量高，但花叶病、倒伏和宿根衰退是限制因素。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N19 原图／官方图页

N21

ZA-abee555ba | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于雨养贫瘠地及Eldana蔗螟压力区；抗该螟虫能力较好，纤维高、倒伏严重时收获困难。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N21 原图／官方图页

N22

ZA-0956f2305 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

限高潜力土壤和可靠灌溉；含糖高、茎直立，水分胁迫耐受差，不宜跨季延迟收获。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N22 原图／官方图页

N23

ZA-7d0c42d3e | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

用于灌溉区中低潜力条件，宿根产出较稳定；抽穗较多，重黏积水地和沙土不适宜。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N23 原图／官方图页

N24

ZA-c95f93a41 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

限高潜力土壤与可靠灌溉，蔗糖含量很高；易倒伏，对盐碱和排水不良条件不耐受。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N24 原图／官方图页

N25

ZA-3f938b4a6 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

用于灌溉区中低潜力条件，沙质浅土及短期缺水下相对表现较好；需关注黑穗病和倒伏。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N25 原图／官方图页

N26

ZA-437e78396 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于灌溉区排水良好的高潜力土壤；早季含糖高，新植产量一般，低温宿根和蔗螟风险需关注。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N26 原图／官方图页

N27

ZA-980797ef4 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于沿海雨养一年收获制；重黏土和一定干旱下表现较好，不宜延长收获周期。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N27 原图／官方图页

N28

ZA-705b94839 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

用于灌溉区中期收获，植株较直立，可耐一定重黏积水条件；耐旱性较差。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N28 原图／官方图页

N30

ZA-f9ec9f75f | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

用于深厚、排水良好且管理可靠的灌溉地，早季表现较好；低潜力土壤和缺水地表现差。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N30 原图／官方图页

N31

ZA-888794228 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

用于内陆及中部高地低潜力沙土，宜超过16个月收获；沿海适应性差，不宜超过20个月。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N31 原图／官方图页](#)

N33

ZA-661c62bc3 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

用于沿海贫瘠沙土及低潜力地，收获周期15至18个月；冷湿坡地易受锈病影响。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N33 原图／官方图页](#)

N35

ZA-fd39716be | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

适用于沿海高潜力环境的一年收获制；不耐缺水和排水不良，不推荐跨季收获。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N35 原图／官方图页](#)

N36

ZA-d420503e0 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

雨养及灌溉条件均可使用，含糖较高、萌芽封行快；高产环境易倒伏，宿根需避免田间碾压。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N36 原图／官方图页](#)

N37

ZA-93cb50ba3 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

适用于内陆及中部高地良好条件和腐殖质土；萌芽封行快，因蔗螟及品质下降不宜超过20个月。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N37 原图](#)／[官方图页](#)

N39

ZA-7ab908fb9 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

沿海及内陆沙土适用品种，宜14至18个月收获；应避浅土，中部高地沙土表现不佳。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N39 原图](#)／[官方图页](#)

N40

ZA-d9ec0a090 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

适用于深厚、排水良好和灌溉可靠的高潜力地；早中季较好，极沙质及高水位积水地不宜。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N40 原图](#)／[官方图页](#)

N41

ZA-7a6d1330e | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

雨养、灌溉和多种土壤适应性较广，12至14个月周期表现较好；雨养极沙质地不宜，注意杂草。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N41 原图](#)／[官方图页](#)

N42

ZA-a056a0263 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

沿海及内陆中高潜力环境适用；沿海早季收获表现较好。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N42 原图](#)／[官方图页](#)

N43

ZA-b34fcc49c | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

用于灌溉区中高潜力环境，中后期收获较好；多次宿根产出相对稳定。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N43 原图](#)／[官方图页](#)

N45

ZA-efc2bc57c | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

适用于沿海及内陆多种土壤的一年收获制；内陆中高潜力地较好，细茎、茎数较多。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N45 原图](#)／[官方图页](#)

N46

ZA-74a447feb | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

适用于北部灌溉区中高潜力土壤及后季收获；宿根表现较好。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N46 原图](#)／[官方图页](#)

N47

ZA-bb50ddfa5 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于沿海及内陆中低潜力地和较长收获周期；用于兼顾Eldana蔗螟压力的选择。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N47 原图／官方图页

N48

ZA-a56bcf4e5 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于内陆及中部高地多种土壤，宜超过15个月收获；沙土和腐殖质土均有较好表现。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N48 原图／官方图页

N49

ZA-00792fbec | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于中高生产潜力土壤，早季和后季表现较好；综合病害评价较好。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N49 原图／官方图页

N50

ZA-a1f29ab4c | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于内陆及中部高地多种土壤，宜超过18个月收获；蔗产量高，沙土亦有较好表现。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N50 原图／官方图页

N51

ZA-c3cacc67f | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于沿海及内陆中低潜力土壤，宜15至18个月周期；长周期表现优于一年周期。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N51 原图／官方图页

N52

ZA-5c2a0de82 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于内陆及中部高地多种土壤，宜超过18个月；蔗产量高，沙土上可回收糖收益较好。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N52 原图／官方图页

N53

ZA-f0d7e5506 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

灌溉区广泛潜力条件适用，可在不同收获时段利用；植株较矮，中高茎密度。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N53 原图／官方图页

N54

ZA-bc7f6ac8c | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

内陆及中部高地多种土壤适用，在较低潜力沙土表现较好；萌芽快、株型直立、茎数多，但感黑穗病，并可早倒伏及多侧芽。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N54 原图／官方图页

N55

ZA-76c5ad08a | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于沿海及内陆，收获年龄12至18个月；高潜力地表现较好，某些条件下萌芽差且对热水处理敏感。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N55 原图／官方图页

N56

ZA-baa10558c | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

用于沿海及内陆15至18个月周期；对Eldana蔗螟抗性较好，但可回收糖产量表现一般。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N56 原图／官方图页

N57

ZA-953b254ac | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

灌溉区多种土壤适用，中季收获较好，冠层形成快；不宜积水，早季可回收糖含量偏低。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N57 原图／官方图页

N58

ZA-30343cb63 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海及内陆中低潜力地适用品种，宜长周期；细茎多、较耐逆，但易倒伏，中部高地表现差。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N58 原图／官方图页

N59

ZA-c67dbd72f | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海及内陆中高潜力地适用，重质土表现较好；可能早倒伏，黑穗病风险需要注意。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N59 原图／官方图页

N60

ZA-f82aeef22 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

主要用于南部灌溉区后季收获；萌芽和封行较快，黑穗病和Eldana蔗螟评价限制适用范围。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N60 原图／官方图页

N61

ZA-1395f2d1c | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

适用于内陆及中部高地沙土，含糖较高；不宜腐殖质土，易倒伏并有霜害风险。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N61 原图／官方图页

N62

ZA-f1b7ebc59 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

内陆及中部高地多种土壤适用；腐殖质土中可回收糖含量略低，易倒伏。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N62 原图／官方图页

N63

ZA-a5f709940 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海中低潜力土壤15至18个月周期适用；茎数多、较抗倒伏，初期生长慢且含糖偏低。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N63 原图／官方图页

N64

ZA-362de7678 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

用于沿海12至15个月周期，中高潜力环境可有较高回收糖产量；存在倒伏和表现不稳定限制。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N64 原图／官方图页

N66

ZA-9be56260e | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

主要针对高海拔雨养及中部高地腐殖质土，18至24个月周期；不宜沙土，沙土宿根较差。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N66 原图／官方图页

N67

ZA-643f8f646 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海雨养中高潜力土壤12至14个月周期适用；宿根较稳定，蔗螟压力区不宜延迟跨季收获。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N67 原图／官方图页

N68

ZA-4e1522225 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

沿海及内陆高潜力土壤14至18个月周期适用；少抽穗，易倒伏，中低潜力地不宜。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N68 原图／官方图页](#)

N69

ZA-747a0b387 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

内陆及中部高地18至24个月周期适用，土壤适应性广、宿根较好；含糖偏低。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N69 原图／官方图页](#)

N70

ZA-a6eea1ede | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

灌溉区一年周期的后季品种；细茎、易倒伏和抽穗，不推荐早季收获。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N70 原图／官方图页](#)

N71

ZA-1657f037f | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：[官方品种图页入口](#)

灌溉区一年周期的后季品种，宿根较好、少抽穗；感Eldana蔗螟，不宜超过12个月。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：[ZA-N71 原图／官方图页](#)

N72

ZA-d85498a0a | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海雨养中高潜力地12至14个月周期适用；宿根和多项病虫害抗性较好，汁液色值较NCo376高。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N72 原图／官方图页

N73

ZA-b60bf9fe7 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

北部灌溉区多种土壤适用，宜一年周期后季收获；含糖偏低，并有加工适应性限制。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N73 原图／官方图页

N74

ZA-1bde09a9b | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

针对中部高地腐殖质土18至24个月周期选育；封行和宿根较好，原说明尚未列出明确限制。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N74 原图／官方图页

N75

ZA-ec7165c8c | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

中部高地腐殖质土和沙土18至24个月周期适用；宿根较好，黑穗病评价为中抗，需关注锈病。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N75 原图／官方图页

N76

ZA-b946d9941 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海雨养短周期品种，应于10月中旬前收获；抽穗、倒伏较多，可回收糖含量偏低。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N76 原图／官方图页

N77

ZA-c3e7cda21 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海雨养短周期品种，中高潜力土壤表现较好；抽穗倒伏较多，加工性相对对照较差。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N77 原图／官方图页

N78

ZA-f4a95fcaf | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

中部高地及高海拔18至24个月周期适用，适应性和宿根较好；细茎，沿海可能大量抽穗。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N78 原图／官方图页

N79

ZA-0283b1ab0 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海雨养中高潜力土壤12至14个月周期适用；宿根较好，高蔗产量条件下易倒伏。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N79 原图／官方图页

N80

ZA-71ff26cd2 | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

灌溉区一年周期适用，可全年安排种收；含糖和宿根较好、较抗倒伏。原说明未列明确限制。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N80 原图／官方图页

N81

ZA-abf5e0c6d | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

灌溉区一年周期适用；蔗产量和宿根较好，高产时易倒伏，3至5月早季含糖偏低。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N81 原图／官方图页

N82

ZA-4bd46ebfe | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海15至18个月周期适用；宿根较好、土壤适应性广，良好生长条件下早季可回收糖含量略低。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-N82 原图／官方图页

NCo376

ZA-ea8662efe | 性状档案 | SASRI品种信息表收录

育成来源：南非；用途：糖用

育种／来源单位：SASRI／南非糖业协会育种体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：南非；分区见说明

图片：官方品种图页入口

沿海良好条件、低病虫压力和一年收获制下的老品种；宿根性尚好，蔗糖含量偏低，通常不宜延迟跨季收获。

核查说明：未把PDF色块选择表中并列印刷的所有等级误当作本品种评级。图片保留官方入口，未复制SASRI受限图版。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：ZA-NCo376 原图／官方图页

毛里求斯 | 品种与材料档案

8条记录 · 核查日期2026-09-29

收录8个可核对的MSIRI品种档案。已附图片均来自对应档案；多个世代的M系列仍未穷尽。

M 1002/02

MU-3868155c5 | 性状档案 | MSIRI已发布品种



育成来源：毛里求斯；用途：糖用
育种／来源单位：MSIRI
亲本：未列明
年份及口径：2016
适用／评价区域：毛里求斯；土类代号按MSIRI体系

品种实物照片 | M 1002/02田间实物照片；MSIRI独立品种说明第1页，拍摄日期未注明。
适用于湿润及半湿润区L、P土类，宜中后季收获，含糖较高。
待补：亲本
来源：MU-X006 原图／官方图页

M 1256/04

MU-00243f95c | 性状档案 | MSIRI已发布品种



育成来源：毛里求斯；用途：糖用
育种／来源单位：MSIRI
亲本：未列明
年份及口径：2017
适用／评价区域：毛里求斯；土类代号按MSIRI体系

品种实物照片 | M 1256/04：MSIRI品种说明中的蔗茎／叶部鉴别实物图；原图未注明拍摄日期。
适用于湿润及半湿润区L、P土类；中季收获，含糖和纤维较高。
待补：亲本
来源：MU-X000 原图／官方图页

M 1392/00

MU-d774011d5 | 性状档案 | MSIRI已发布品种



育成来源：毛里求斯；用途：糖用
育种／来源单位：MSIRI
亲本：未列明
年份及口径：2015
适用／评价区域：毛里求斯；土类代号按MSIRI体系

品种实物照片 | M 1392/00田间实物照片；MSIRI独立品种说明第1页，拍摄日期未注明。
适用于湿润及半湿润区，含糖和糖产量较高，宜早中季收获。
待补：亲本
来源：MU-X005 原图／官方图页

M 1989/99

MU-91730876d | 性状档案 | MSIRI已发布品种



育成来源：毛里求斯；用途：糖用
育种／来源单位：MSIRI
亲本：未列明
年份及口径：2013
适用／评价区域：毛里求斯；土类代号按MSIRI体系

品种实物照片 | M 1989/99: MSIRI品种说明中的蔗茎／叶部鉴别实物图；原图未注明拍摄日期。

适用于湿润及半湿润区L、P土类；高蔗产量、含糖中等，宜中季收获。

待补：亲本

来源：MU-X001 [原图](#)／[官方图页](#)

M 2283/98

MU-b884563e2 | 名称／身份 | MSIRI发布目录记录

育成来源：毛里求斯；用途：糖用
育种／来源单位：MSIRI
亲本：未列明
年份及口径：2015

适用／评价区域：详见原始资料

图片：尚缺可确认的品种照片

MSIRI目录列为2015年发布品种；独立说明链接失效，本版仅确认名称及发布时间，性状与图片待补。

待补：亲本、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：MU-LIST

M 2502/99

MU-61b66907c | 性状档案 | MSIRI已发布品种



育成来源：毛里求斯；用途：糖用
育种／来源单位：MSIRI
亲本：未列明
年份及口径：2015
适用／评价区域：毛里求斯；土类代号按MSIRI体系

品种实物照片 | M 2502/99田间实物照片；MSIRI独立品种说明第1页，拍摄日期未注明。

适用于湿润区B、F土类和灌溉P土类，宜中季收获，蔗糖产出较高。

待补：亲本

来源：MU-X004 [原图](#)／[官方图页](#)

M 683/99

MU-14a62130a | 性状档案 | MSIRI已发布品种



育成来源：毛里求斯；用途：糖用
育种／来源单位：MSIRI
亲本：未列明
年份及口径：2015
适用／评价区域：毛里求斯；土类代号按MSIRI体系

品种实物照片 | M 683/99田间实物照片；MSIRI独立品种说明第1页，拍摄日期未注明。
适用于湿润及半湿润区L、P土类，宜中后季收获，蔗产量与糖产量较高。
待补：亲本
来源：MU-X003 原图／官方图页

M 915/05

MU-c73b0b502 | 性状档案 | MSIRI已发布品种



育成来源：毛里求斯；用途：糖用
育种／来源单位：MSIRI
亲本：未列明
年份及口径：2016
适用／评价区域：毛里求斯；土类代号按MSIRI体系

品种实物照片 | M 915/05田间实物照片；MSIRI独立品种说明第1页，拍摄日期未注明。
原说明显示土壤及农业气候适应面较广；宜中季收获，蔗产量和糖产量较高。
待补：亲本
来源：MU-X007 原图／官方图页


法国（留尼汪） | 品种与材料档案

14条记录 · 核查日期2026-09-29

法国专题限留尼汪甘蔗育种，含13个R系列档案及R587历史状态。R587因橙锈病问题退出推荐的状态独立注明，不能按新品种宣传。

R 570

FR-50e8390d5 | 性状档案 | eRcane品种目录收录




育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 570：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
各主要产区可用；西部与南部较高海拔及东部高地适应性有限。
待补：亲本、育成／发布年份
来源：FR-D13P 原图／官方图页

R 575

FR-9ebcd41fa | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：1986
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 575：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
较早成熟，官方目录作为多个种植区可用的早季品种。
待补：亲本
来源：FR-D12P 原图／官方图页

R 577

FR-fb3997cee | 性状档案 | eRcane品种目录收录




育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：1987
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 577：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
适用于西部与南部约400至700米地带，中季收获。
待补：亲本
来源：FR-D11P 原图／官方图页

R 579

FR-551ef6ddf | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：1993
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明


品种实物照片 | R 579：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
适用于湿润或灌溉沿海，中后季利用。

待补：亲本

来源：FR-D10P 原图／官方图页

R 581

FR-11550f1c6 | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2006
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 581：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
适用于西南部300米以上的中海拔非灌溉地。

待补：亲本

来源：FR-D09P 原图／官方图页

R 582

FR-e0203fb7c | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2006
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明


品种实物照片 | R 582：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
适用于东部沿海及西部灌溉条件。

待补：亲本

来源：FR-D08P 原图／官方图页

R 583

FR-decf75f3e | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2008
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 583：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
适用于背风侧较干燥、非灌溉的高地。

待补：亲本

来源：FR-D07P 原图／官方图页

R 584

FR-2a02dcce9 | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2009
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 584：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
主要针对西南部沿海灌溉区。

待补：亲本

来源：FR-D06P 原图／官方图页

R 585

FR-7ec4cdaae | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2010
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 585：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
生长旺、纤维较高，可用于较差土壤及高地；因黑穗病反应限制，强调迎风侧适用区。

待补：亲本

来源：FR-D05P 原图／官方图页

R 586

FR-7aa072a91 | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2013
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 586：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
针对西部较干的非灌溉高地；低海拔或灌溉高产环境可发生倒伏。

待补：亲本

来源：[FR-D04P 原图](#)／[官方图页](#)

R 587

FR-6288dbd76 | 状态与性状 | 不再推荐（橙锈病）

育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane

亲本：未列明

年份及口径：2016

适用／评价区域：留尼汪

图片：尚缺可确认的品种照片

2016年发布；2018年出现橙锈病问题，eRcane目录明确标为不再推荐。保留为历史育种成果，不列作现行推广建议。

待补：亲本、品种实物照片

来源：[FR-LIST](#)

R 588

FR-34f177cf6 | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2022
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 588：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
面向较干高地，可至约1000米；含糖表现较好，抽穗受季节影响。

待补：亲本

来源：[FR-D03P 原图](#)／[官方图页](#)

R 589

FR-fdfc93560 | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2023
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 589：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
面向无明显水分胁迫的沿海，宿根表现较好。

待补：亲本

来源：[FR-D02P 原图](#)／[官方图页](#)

R 590

FR-fa1fb80e9 | 性状档案 | eRcane品种目录收录



育成来源：法国（留尼汪）；用途：糖用
育种／来源单位：eRcane（含前身机构）
亲本：未列明
年份及口径：2023
适用／评价区域：留尼汪，具体分区见说明

品种实物照片 | R 590：eRcane独立品种说明所附实物照片；用于外观识别，拍摄日期未注明。
植株较直立、纤维较高，针对东部湿润高地；黑穗病反应限制其向其他生态区推广。

待补：亲本

来源：[FR-D01P 原图](#)／[官方图页](#)

哥伦比亚 | 品种与材料档案

29条记录 · 核查日期2026-09-29

主体为Cenicaña 2003年第二版历史品种目录。整份目录的34个材料按育成来源分置不同国家；本专题含CC及CCSP记录，最新CC系列尚未完整覆盖。

CC 82-15

CO-b971ecfde | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案



育成来源：哥伦比亚；用途：糖用
育种／来源单位：Cenicaña
亲本：EPC 54839 × EPC 72174
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

品种实物照片 | CC 82-15蔗茎／节部鉴别实物图；Cenicaña《Catálogo de variedades》第二版（2003）。图片为历史档案。
Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间、节间略弯曲。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
来源：CO-CAT · PDF第20页 原图／官方图页

CC 82-26

CO-a7de6874b | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用
育种／来源单位：Cenicaña
亲本：PR 905 × Co 775
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区
图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间、节间略弯曲。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
待补：品种实物照片
来源：CO-CAT · PDF第22页 原图／官方图页

CC 82-27

CO-3eb18af7b | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用
育种／来源单位：Cenicaña
亲本：PR 905 × Co 775
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区
图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
待补：品种实物照片
来源：CO-CAT · PDF第24页 原图／官方图页

CC 82-28

CO-f934a4b4a | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：EPC 54839 × EPC 72174

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录，原页列示形态、农艺和当地试验评价。保留为历史品种档案，不据历史结果推定2026年推广状态。

待补：育成／发布年份、品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第26页 原图／官方图页

CC 83-25

CO-20858c763 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：POJ 2878 × CP 63-588

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录，原页列示形态、农艺和当地试验评价。保留为历史品种档案，不据历史结果推定2026年推广状态。

待补：育成／发布年份、品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第28页 原图／官方图页

CC 84-10

CO-4f5e63e76 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：SP 70-3370 × SP 70-1143

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第30页 原图／官方图页

CC 84-56

CO-f14bf0513 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：NA 56-79 × ?

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第32页 原图／官方图页

CC 84-66

CO-3a5261d82 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：F 160 × ?

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第34页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CC 84-75

CO-9e22f03b0 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：NA 56-79 × ?

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第36页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CC 85-63

CO-8d7f8ab5b | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：POJ 2878 × ?

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第38页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CC 85-68

CO-eddda34e0 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：POJ 2878 × ?

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间、节间略弯曲。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第40页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CC 85-92

CO-d6f405aa7 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案



育成来源：哥伦比亚；用途：糖用
育种／来源单位：Cenicaña
亲本：Co 775 × ?
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

品种实物照片 | CC 85-92蔗茎／节部鉴别实物图；Cenicaña《Catálogo de variedades》第二版（2003）。图片为历史档案。
Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
来源：CO-CAT · PDF第42页 原图／官方图页

CC 85-96

CO-e6cda9762 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用
育种／来源单位：Cenicaña
亲本：EPC 54839 × ?
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口
Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
待补：品种实物照片
来源：CO-CAT · PDF第44页 原图／官方图页

CC 86-33

CO-9becb2e28 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用
育种／来源单位：Cenicaña
亲本：D 200/36 × CP 57-603
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口
Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
待补：品种实物照片
来源：CO-CAT · PDF第46页 原图／官方图页

CC 87-434

CO-952034de9 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用
育种／来源单位：Cenicaña
亲本：POJ 2878 × ?
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口
Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间、节间略弯曲。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
待补：品种实物照片
来源：CO-CAT · PDF第48页 原图／官方图页

CC 87-505

CO-9eb29eff5 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：ICA 74-4 × ICA 75-5

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第50页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CC 89-2000

CO-5daccafc4 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：EPC 54839 × Co 775

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第52页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CC 91-1555

CO-10dfc8c4e | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：CP 59-73 × MZC 81-78

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录，原页列示形态、农艺和当地试验评价。保留为历史品种档案，不据历史结果推定2026年推广状态。

待补：育成／发布年份、品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第54页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CC 91-1880

CO-1c280ece1 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：ICA 67-22 × CP 68-1026

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间、节间略弯曲。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第56页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CC 91-1945

CO-ee71ffa03 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：Mex 68-808 × CP 79-1376

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间、节间略弯曲。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第58页 原图／官方图页

CC 92-2154

CO-2033eebb1 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：EPC 38122 × MZC 74-275

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录，原页列示形态、农艺和当地试验评价。保留为历史品种档案，不据历史结果推定2026年推广状态。

待补：育成／发布年份、品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第60页 原图／官方图页

CC 92-2198

CO-595036727 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：V 71-51 × MZC 74-275

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第62页 原图／官方图页

CC 92-2358

CO-db9a7c165 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：Mex 64-1487 × MZC 74-275

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第64页 原图／官方图页

CC 92-2393

CO-60e109016 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：Mex 64-1487 × ICA 69-11

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：官方品种图页入口

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：CO-CAT · PDF第66页 原图／官方图页

CC 93-4223

CO-9bda91c33 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案



育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：未列明

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

品种实物照片 | CC 93-4223蔗茎／节部鉴别实物图；Cenicaña《Catálogo de variedades》第二版（2003）。图片为历史档案。

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间、节间略弯曲。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：亲本

来源：CO-CAT · PDF第68页 原图／官方图页

CC 94-5827

CO-92a4eb7fb | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案



育成来源：哥伦比亚；用途：糖用

育种／来源单位：Cenicaña

亲本：V 71-51 × ?

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

品种实物照片 | CC 94-5827蔗茎／节部鉴别实物图；Cenicaña《Catálogo de variedades》第二版（2003）。图片为历史档案。

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

来源：CO-CAT · PDF第70页 原图／官方图页

CCSP 89-1997

CO-430e03e3b | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚／巴西协作材料（确切权属待核）；用途：糖用

育种／来源单位：原目录品种来源机构（待细核）

亲本：SP 70-3370 × SP 70-1078

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第76页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CCSP 89-259

CO-53c5803b3 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚／巴西协作材料（确切权属待核）；用途：糖用

育种／来源单位：原目录品种来源机构（待细核）

亲本：SP 71-3146 × SP 70-1143

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第74页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

CCSP 89-43

CO-64297e87c | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案

育成来源：哥伦比亚／巴西协作材料（确切权属待核）；用途：糖用

育种／来源单位：原目录品种来源机构（待细核）

亲本：SP 70-1143 × SP 71-799

年份及口径：2003（目录）

适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

图片：[官方品种图页入口](#)

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

待补：品种实物照片

来源：[CO-CAT](#) · [PDF第72页](#) [原图](#)／[官方图页](#)

阿根廷 | 品种与材料档案

4条记录 · 核查日期2026-09-29

收录4个具有独立公开页面的TUC品种。EEAOC及其他机构历年TUC、NA等材料尚未形成完整国家清单。

TUC 00-19

AR-d391f0e72 | 性状／发布摘要 | 已发布

育成来源：阿根廷；用途：糖用

育种／来源单位：EEAOC

亲本：未列明

年份及口径：2013

适用／评价区域：阿根廷图库曼

图片：尚缺可确认的品种照片

早熟、初期萌芽封行快、较直立，适合全程机械收获；EEAOC试验显示花叶、黑穗、叶灼等病害反应较好。

待补：亲本、品种实物照片

来源：AR-X008

TUC 02-22

AR-9b3d6e83c | 性状／发布摘要 | 已发布

育成来源：阿根廷；用途：糖用

育种／来源单位：EEAOC

亲本：未知

年份及口径：2019

适用／评价区域：阿根廷图库曼

图片：尚缺可确认的品种照片

EEAOC于2019年发布。不同试验地点蔗产量表现较好；本源明确亲本未知，不能按品种编号反推亲本。

待补：品种实物照片

来源：AR-X009

TUC 03-12

AR-d675042e0 | 性状／发布摘要 | 已发布

育成来源：阿根廷；用途：糖用

育种／来源单位：EEAOC

亲本：未列明

年份及口径：2015

适用／评价区域：阿根廷图库曼

图片：尚缺可确认的品种照片

EEAOC于2015年5月发布的TUC系列品种，是该机构当时第五个发布品种；具体形态与病害反应见机构说明。

待补：亲本、品种实物照片

来源：AR-X010

TUC 06-7

AR-0e54bb120 | 性状／发布摘要 | 已发布

育成来源：阿根廷；用途：糖用

育种／来源单位：EEAOC

亲本：未列明

年份及口径：2019

适用／评价区域：阿根廷图库曼

图片：尚缺可确认的品种照片

EEAOC于2019年发布的TUC系列品种；作为当地品种结构多样化的材料，其适应性不能直接外推其他国家。

待补：亲本、品种实物照片

来源：AR-X011

古巴 | 品种与材料档案

12条记录 · 核查日期2026-09-29

12个C系列材料来自原始研究中的黄叶病评价材料表。出现于试验表并不等于取得商业发布身份；全国INICA历史品种册仍需补入。

C1051-73

CU-9b1770170 | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核

育成来源：古巴；用途：糖用

育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）

亲本：未列明

年份及口径：2012（论文）

适用／评价区域：古巴试验条件

图片：尚缺可确认的品种照片

古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CU-TRIAL

C120-78

CU-b413d65ed | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核

育成来源：古巴；用途：糖用

育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）

亲本：未列明

年份及口径：2012（论文）

适用／评价区域：古巴试验条件

图片：尚缺可确认的品种照片

古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CU-TRIAL

C132-81

CU-4f5693b4d | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核

育成来源：古巴；用途：糖用

育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）

亲本：未列明

年份及口径：2012（论文）

适用／评价区域：古巴试验条件

图片：尚缺可确认的品种照片

古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CU-TRIAL

C85-102

CU-d03ecdc71 | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核

育成来源：古巴；用途：糖用

育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）

亲本：未列明

年份及口径：2012（论文）

适用／评价区域：古巴试验条件

图片：尚缺可确认的品种照片

古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CU-TRIAL

C86-12

CU-b2caa30bb | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核

育成来源：古巴；用途：糖用

育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）

亲本：未列明

年份及口径：2012（论文）

适用／评价区域：古巴试验条件

图片：尚缺可确认的品种照片

古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CU-TRIAL

C86-156

CU-fcd947f5a | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核

育成来源：古巴；用途：糖用

育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）

亲本：未列明

年份及口径：2012（论文）

适用／评价区域：古巴试验条件

图片：尚缺可确认的品种照片

古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CU-TRIAL

C86-165

CU-6cbb9a200 | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核

育成来源：古巴；用途：糖用

育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）

亲本：未列明

年份及口径：2012（论文）

适用／评价区域：古巴试验条件

图片：尚缺可确认的品种照片

古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CU-TRIAL

C86-503

CU-0e9021364 | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核
育成来源：古巴；用途：糖用
育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）
亲本：未列明
年份及口径：2012（论文）
适用／评价区域：古巴试验条件
图片：尚缺可确认的品种照片
古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。
待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：CU-TRIAL

C87-51

CU-9bdb2ba9e | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核
育成来源：古巴；用途：糖用
育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）
亲本：未列明
年份及口径：2012（论文）
适用／评价区域：古巴试验条件
图片：尚缺可确认的品种照片
古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。
待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：CU-TRIAL

C89-161

CU-c0d8a57f7 | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核
育成来源：古巴；用途：糖用
育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）
亲本：未列明
年份及口径：2012（论文）
适用／评价区域：古巴试验条件
图片：尚缺可确认的品种照片
古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。
待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：CU-TRIAL

C90-501

CU-f7f449426 | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核
育成来源：古巴；用途：糖用
育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）
亲本：未列明
年份及口径：2012（论文）
适用／评价区域：古巴试验条件
图片：尚缺可确认的品种照片
古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。
待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：CU-TRIAL

C90-530

CU-b2d43a41a | 名称／身份 | 研究用既有品种，发布信息待核

育成来源：古巴；用途：糖用

育种／来源单位：古巴育种体系（具体单位待核）

亲本：未列明

年份及口径：2012（论文）

适用／评价区域：古巴试验条件

图片：尚缺可确认的品种照片

古巴研究人员的甘蔗黄化症状试验列为供试品种。该研究能确认材料身份与研究用途，不能据此概括为全面抗病品种或现行全国主栽品种。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：CU-TRIAL

墨西哥 | 品种与材料档案

2条记录 · 核查日期2026-09-29

由哥伦比亚和哥斯达黎加机构档案确认的墨西哥育成材料组成，不代表墨西哥国内全部Mex系列及历年审定品种。

Mex 64-1487

MX-aa5aee38b | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案



育成来源：墨西哥（哥伦比亚试验）；用途：糖用
育种／来源单位：原目录品种来源机构（待细核）
亲本：POJ 2878 × ?
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

品种实物照片 | Mex 64-1487蔗茎／节部鉴别实物图；Cenicaña《Catálogo de variedades》第二版（2003）。图片为历史档案。
Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
来源：CO-CAT · PDF第78页 原图／官方图页

MEX 79-431

MX-817faa4ef | 性状摘要 | 区域商业品种目录收录

MEX 79-431 (C0-421 x MEX 57-475)	
Procedencia	LaICA, Costa Rica
Descripción	Variedad de caña de azúcar, ciclo semillero, con alto rendimiento de sacarosa y buena adaptación a condiciones tropicales.
Altura	3.50 m
Forma de la planta	Planta de caña de azúcar, con hojas largas y estrechas.
Forma de la panocha	Panocha compacta, con hojas largas y estrechas.
Forma de la caña	Caña de azúcar, con hojas largas y estrechas.
Forma de la panocha	Panocha compacta, con hojas largas y estrechas.
Forma de la caña	Caña de azúcar, con hojas largas y estrechas.
Forma de la panocha	Panocha compacta, con hojas largas y estrechas.
Forma de la caña	Caña de azúcar, con hojas largas y estrechas.



育成来源：墨西哥；用途：糖用
育种／来源单位：原育种机构待核
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：哥斯达黎加高地（该来源评价地）

品种实物照片 | MEX 79-431：LAICA区域品种页面所配实物图；拍摄年月未注明。
中晚熟，适于中高肥力及水分较好的条件；本来源为哥斯达黎加引种评价。
待补：亲本、育成／发布年份、育种单位
来源：CR-LIST 原图／官方图页

泰国 | 品种与材料档案

2条记录 · 核查日期2026-09-29

收录可核对的Khon Kaen 3及Nakhon Sawan 1资料。泰国DOA、大学与企业历年育种品种仍需逐一补齐。

Khon Kaen 3

TH-3b7893ffd | 性状摘要 | DOA认可品种

育成来源：泰国；用途：糖用

育种／来源单位：泰国农业厅Khon Kaen Field Crops Research Center

亲本：未列明

年份及口径：2008

适用／评价区域：泰国东北部雨养砂壤土

别名：ขี้เหล็กขี้เหล็ก 3

图片：尚缺可确认的品种照片

2008年9月30日获认可，适于东北部雨养砂壤土蔗区。株型直立、叶鞘较松、不易抽穗；官方对照试验显示新植及第一宿根表现较好。

待补：亲本、品种实物照片

来源：BASE-TH1

Nakhon Sawan 1

TH-be14c1587 | 官方品种档案 | DOA认可品种



育成来源：泰国；用途：糖用

育种／来源单位：泰国农业厅

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：泰国；按原档案分区

别名：ขี้เหล็กขี้เหล็ก 1

品种实物照片 | Nakhon Sawan 1官方品种田景；泰国DOA。取景站点及拍摄年月未注明。

泰国农业厅发布的甘蔗品种，经历杂交、实生选择及区域试验。完整形态、当地产量和适宜区域见官方品种档案。

待补：亲本、育成／发布年份

来源：BASE-TH2 原图／官方图页

印度尼西亚 | 品种与材料档案

26条记录 · 核查日期2026-09-29

收录P3GI商业品种独立档案中的26个本地材料。VMC 76-16在来源中明确为菲律宾引进，归入菲律宾专题；该机构档案并非印尼全部历史品种。

BL (Bululawang)

ID-7d6510f9a | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用
育种／来源单位：-
亲本：Varietas lokal di daerah Bululawang, Malang Selatan
年份及口径：2004-05-12（印尼发布）
适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | BL (Bululawang)：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。
萌芽：良好；初期生长：晚熟；茎径等级：中等至大；茎密度：密；抽穗：零星至多；熟期：中晚熟；纤维含量：13% - 14%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。
核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。
来源：ID-X022 原图／官方图页

CENNING

ID-2cbfccc9 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用
育种／来源单位：Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (
亲本：Diperoleh Tahun 2000 dari Proyek PG Lambuya Sulawesi Tenggara dengan nama asal SM 86
年份及口径：2000-01-01（印尼发布）
适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | CENNING：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。
萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：密；抽穗：少至零星；熟期：早中熟；纤维含量：原表未列明；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。
核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。
来源：ID-X014 原图／官方图页

KENTUNG

ID-40c8bd1b1 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

亲本：Pertama kali ditemukan di lahan petani di Dukuh Kentung, Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

年份及口径：2008-10-08（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | KENTUNG：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：快；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：零星；熟期：早中熟；纤维含量：± 14,51%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X031 [原图](#)／[官方图页](#)

KK (Kidang Kencana)

ID-98a7e8375 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：PT PG Rajawali Nusantara II

亲本：Tidak diketahui, pertama kali berkembang di Dusun Kencana, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka Jawa Barat dengan nama PA 198

年份及口径：2008-03-28（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | KK (Kidang Kencana)：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。


萌芽：良好；初期生长：快；茎径等级：中等至大；茎密度：中等；抽穗：零星；熟期：中晚熟；纤维含量：± 13%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X015 [原图](#)／[官方图页](#)

PS 091

ID-ce2b940c2 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan

亲本：Persilangan PS 862 x IJ 76-370

年份及口径：2017-02-14（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS 091：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：零星；熟期：早中熟；纤维含量：± 13.96%；宿根性：较抗。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X035 [原图](#)／[官方图页](#)

PS 092

ID-8ba72437f | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用
育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan
亲本：Persilangan PS 862 x IJ 76-374
年份及口径：2017-02-14（印尼发布）
适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS 092：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：密；抽穗：零星；熟期：中熟；纤维含量：± 12.19%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X016 [原图](#)／[官方图页](#)

PS 094

ID-774afd44d | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用
育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan
亲本：Persilangan PS 862 x IJ 370
年份及口径：2020-03-31（印尼发布）
适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS 094：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好；初期生长：快；茎径等级：中等；茎密度：密；抽穗：不抽穗至零星抽穗；熟期：中晚熟；纤维含量：13.06 ± 0.75%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X037 [原图](#)／[官方图页](#)

PS 851

ID-24613cb35 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用
育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan
亲本：Antara PS 57 x B 37173 pada tahun 1985 dari nomor seleksi PS 85-21460
年份及口径：2000-01-01（印尼发布）
适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS 851：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：快；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：不抽穗至零星抽穗；熟期：早中熟；纤维含量：± 13%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X013 [原图](#)／[官方图页](#)

PS 862

ID-1e5431719 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan

亲本：Persilangan F162 polycross pada tahun 1986 dari nomor seleksi PS 86-8504

年份及口径：1998-10-09（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS 862：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：大；茎密度：中等；抽穗：中等；熟期：早中熟；纤维含量：± 12%；宿根性：较抗。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X034 [原图](#)／[官方图页](#)

PS 864

ID-7ec6ae06f | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan

亲本：Persilangan PR 1117 polycross pada tahun 1986 dari nomor seleksi PS 86-10029

年份及口径：2004-01-16（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS 864：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好；初期生长：快；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：零星；熟期：中晚熟；纤维含量：± 13%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X017 [原图](#)／[官方图页](#)

PS 881

ID-a3dd49dba | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan

亲本：persilangan dari BQ 33 polycross

年份及口径：2008-10-08（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS 881：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：中等；熟期：早熟；纤维含量：± 13.47%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X023 [原图](#)／[官方图页](#)

PS 882

ID-2b19b19b1 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan

亲本：Persilangan dari BU 794 polycross

年份及口径：2008-10-08（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS 882: P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：零星；熟期：早中熟；纤维含量：± 13.42%；宿根性：较抗。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X026 原图／官方图页

PS Nusantara 053

ID-9777d6f94 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)/ P3GI PT Kebon Agung, PTPN VII, PTPN X, PTPN XI

亲本：POJ 2722 x CP 44-101

年份及口径：2022-11-18（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PS Nusantara 053: P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等至密；抽穗：少；熟期：中熟；纤维含量：15,30%；宿根性：良好。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X038 原图／官方图页

PSBK 051

ID-781bcbb95 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) / P3GI dan UPT Pengujian & Pengawas Mutu Benih Tan

亲本：Persilangan BF 75 x TUC 73-3

年份及口径：2018-02-26（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSBK 051: P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：不抽穗；熟期：晚熟；纤维含量：± 12,12%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X012 原图／官方图页

PSBK 061

ID-a021fb5e8 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) / P3GI dan UPT Pengujian & Pengawas Mutu Benih Tan

亲本：Persilangan PS 94-156 polycross

年份及口径：2018-02-26（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSBK 061：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：少至零星；熟期：早中熟；纤维含量：± 13,04%；宿根性：较抗。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X030 原图／官方图页

PSBM 901

ID-0be5b6c53 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan

亲本：Hasil persilangan PS 78-127 polycross pada tahun 1990 dari nomor seri PSBM 90-44

年份及口径：2004-01-16（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSBM 901：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好且整齐；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：不抽穗；熟期：早熟；纤维含量：± 13%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X029 原图／官方图页

PSBM 971

ID-35704d00e | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) / P3GI, PT Kebon Agung, PTPN VII, PTPN X, PTPN XI

亲本：Persilangan DB/I / 81 polycross

年份及口径：2022-11-18（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSBM 971：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等至密；抽穗：少；熟期：中晚熟；纤维含量：13,50%；宿根性：很好。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X024 原图／官方图页

PSDK 923

ID-32966bd85 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pemerintah Provinsi Jawa Timur

亲本：Pemutihan klon PS 92 -1871

年份及口径：2013-08-12（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSDK 923: P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等至大；茎密度：密；抽穗：少至零星；熟期：中晚熟；纤维含量：11% - 13%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X036 [原图](#)／[官方图页](#)

PSJK 922

ID-73789170d | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan dan PT Perkebunan Nusantara X, Surabaya

亲本：PS 58 Polycross Tahun 1992, dengan nama klon PS 92-750

年份及口径：2012-02-20（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSJK 922: P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：快；茎径等级：大；茎密度：密；抽穗：不抽穗至零星抽穗；熟期：早中熟；纤维含量：11% - 13%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X027 [原图](#)／[官方图页](#)

PSJT 941

ID-ba2a82459 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan

亲本：Persilangan Polycross BP 1854 tahun 1994

年份及口径：2007-07-05（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSJT 941: P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好；初期生长：快；茎径等级：中等；茎密度：密；抽穗：不抽穗至零星抽穗；熟期：早中熟；纤维含量：± 14%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X021 [原图](#)／[官方图页](#)

PSKA 062

ID-185624214 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) / P3GI, PT Kebon Agung, PTPN VII, PTPN X, PTPN XI

亲本：Erros Polycross

年份及口径：2022-11-18（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSKA 062：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。


萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等至密；抽穗：少；熟期：中晚熟；纤维含量：12,40%；宿根性：良好。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X032 [原图](#)／[官方图页](#)

PSKA 095

ID-50443f360 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) / P3GI, PT Kebon Agung, PTPN VII, PTPN X, PTPN XI

亲本：PS 862 x IJ 76-370

年份及口径：2022-11-18（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSKA 095：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：很快；茎径等级：中等至大；茎密度：中等至密；抽穗：极少；熟期：早中熟；纤维含量：15,10%；宿根性：良好。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X019 [原图](#)／[官方图页](#)

PSKA 942

ID-3e18eb817 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI Pasuruan/ P3GI, PT KEBON AGUNG, PYPN X. PTPN XI, PT

亲本：Persilangan BT 1323 Polycross

年份及口径：2020-03-31（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSKA 942：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：快；茎径等级：中等；茎密度：密；抽穗：不抽穗至零星抽穗；熟期：早中熟；纤维含量：14.41 ± 0.97%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X025 [原图](#)／[官方图页](#)

PSNX 052

ID-dd5a21fb8 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) / P3GI, PT Kebon Agung, PTPN VII, PTPN X, PTPN XI

亲本：Q 81 x F 153

年份及口径：2022-11-18（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSNX 052：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等至密；抽穗：少；熟期：中晚熟；纤维含量：11,80；宿根性：良好。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X020 原图／官方图页

PSNXI 943

ID-4d23620c0 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) / P3GI, PT Kebon Agung, PTPN VII, PTPN X, PTPN XI

亲本：Persilangan BT 1323 polycross

年份及口径：2022-11-18（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | PSNXI 943：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等至密；抽穗：极少；熟期：中熟；纤维含量：15,50%；宿根性：良好。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X028 原图／官方图页

TLH 1

ID-594103ba6 | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：印度尼西亚；用途：糖用

育种／来源单位：Pemerintah Provinsi Gorontalo, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surab

亲本：Dari Kendari (Mr. Huang Chung Wu) dengan kode klon CW 2161

年份及口径：2010-11-12（印尼发布）

适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | TLH 1：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：中等；初期生长：中等；茎径等级：大；茎密度：中等；抽穗：不抽穗至零星抽穗；熟期：早中熟；纤维含量：原表未列明；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。

来源：ID-X018 原图／官方图页

菲律宾 | 品种与材料档案

28条记录 · 核查日期2026-09-29

合并27张菲律宾SRA官方品种卡和在和P3GI档案中确认的VMC 76-16引进记录。照片与品种卡逐一匹配；图卡未列的年份和亲本不作猜测。

PHIL 2000-0791

PH-01a7aa6dd | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 85-23-4345 × Phil 8943
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2000-0791：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。

株型较直立；生长较快；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。

待补：育成／发布年份

来源：PH-D20 原图／官方图页

PHIL 2000-1419

PH-b514ebdcc | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 88-121-0363 X Phil 92-1043
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2000-1419：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。

株型直立至倾斜；生长较快。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。

待补：育成／发布年份

来源：PH-D10 原图／官方图页

PHIL 2000-2155

PH-c896fd8c5 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Akoki Green × VMC 90-239
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2000-2155：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。

株型较直立；生长较快；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。

待补：育成／发布年份

来源：PH-D9 原图／官方图页

PHIL 2000-2417

PH-ac77bb783 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 8717 × Phil 90-1187-1237
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2000-2417：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D8 原图／官方图页

PHIL 2000-2569

PH-c648a103b | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 83-129-3401 × VMC 90-239
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2000-2569：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜；生长较快。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D19 原图／官方图页

PHIL 2001-0295

PH-6ba6b7712 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：VMC 90-239 × Phil 88-620-1413
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2001-0295：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型较直立；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D18 原图／官方图页

PHIL 2002-0359

PH-f219348be | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 93-3849 × VMC 87-599
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2002-0359：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型较直立；生长较快。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D17 原图／官方图页

PHIL 2002-0421

PH-8af42b8cf | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Q102 × Phil 92-44-0751
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2002-0421：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型较直立；生长较快；原卡记为不抽穗。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D7 原图／官方图页

PHIL 2003-0021

PH-5e389a558 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 93-34-0385 × Phil 92-41-0727
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2003-0021：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型较直立；生长速度中等；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D6 原图／官方图页

PHIL 2003-1389

PH-c7e183dc7 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 89-36-0455 × Phil 88-620-1413
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2003-1389：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。

株型较直立；生长较快；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。

待补：育成／发布年份

来源：PH-D16 原图／官方图页

PHIL 2003-1727

PH-06a857ac6 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 93-300-4207 × Phil 93-1902349
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2003-1727：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。

株型较直立；生长较快；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。

待补：育成／发布年份

来源：PH-D5 原图／官方图页

PHIL 2004-0827

PH-d7b7ba0ee | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 79-27-0019 × Phil 93-65-0775
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2004-0827：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。

株型较直立。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。

待补：育成／发布年份

来源：PH-D15 原图／官方图页

PHIL 2004-1011

PH-63824300e | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 88-626-1691 × Phil 93-2349
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2004-1011：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜；生长较快。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D14 原图／官方图页

PHIL 2005-0055

PH-1ab59a296 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 93-34-0385 × Phil 00-156-1161
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2005-0055：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型较直立；生长较快。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D4 原图／官方图页

PHIL 2005-0483

PH-0cb051ec9 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 79-57-1915 × Phil 97-0693
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2005-0483：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型较直立；生长较快。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D3 原图／官方图页

PHIL 2005-0645

PH-baa4d043c | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 78-86-3981 × Phil 93-65-0775
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2005-0645：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型较直立；生长速度中等。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D13 原图／官方图页

PHIL 2005-1197

PH-02c274aed | 亲本／原始品种卡 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：VMC 90-239 × Phil 94-0913
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2005-1197：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
SRA官方品种卡收录，亲本可由原卡核对。已附独立品种实物图；具体形态和病害评价见原卡，缺少试验年份的产量数字未转写为一般产量承诺。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D12 原图／官方图页

PHIL 2005-1763

PH-4bbb5367e | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 8829 × Phil 99-0383
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2005-1763：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型较直立；生长速度中等；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D2 原图／官方图页

PHIL 2006-1899

PH-062bbb034 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：PHIL 92-0051 × Phil 93-2349
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2006-1899：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜；生长速度中等；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D1 原图／官方图页

PHIL 2006-2289

PH-00aba2db9 | 性状档案 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 98-258-3403 × Phil 8477
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 2006-2289：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
植株直立至倾斜、长势较快，抽穗很少；中等茎径、蜡粉较重，蔗茎黄绿色并带紫色。原卡报告抗黑穗、霜霉及叶焦病，但感黄斑病。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D0 原图／官方图页

PHIL 97-0693

PH-f38377900 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Q 102 × Phil 84-438-5799
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 97-0693：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜；生长较快；抽穗较多。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D26 原图／官方图页

PHIL 97-1123

PH-1dad8f8d6 | 亲本／原始品种卡 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 88-626-1691 × Phil 91-110-0807
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 97-1123：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
SRA官方品种卡收录，亲本可由原卡核对。已附独立品种实物图；具体形态和病害评价见原卡，缺少试验年份的产量数字未转写为一般产量承诺。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D25 原图／官方图页

PHIL 97-2041

PH-f4d79f13c | 亲本／原始品种卡 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 90-0343 × Phil 92-3-0023
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 97-2041：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
SRA官方品种卡收录，亲本可由原卡核对。已附独立品种实物图；具体形态和病害评价见原卡，缺少试验年份的产量数字未转写为一般产量承诺。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D24 原图／官方图页

PHIL 99-0925

PH-3e4157bf1 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 92-29-0535 × Phil 91-182-1217
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 99-0925：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜；生长较快；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D11 原图／官方图页

PHIL 99-1427

PH-4bc163f66 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 81-341-3415 × Phil 92-73-1043
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 99-1427：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜；生长较快。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D22 原图／官方图页

PHIL 99-1793

PH-8bae55198 | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 93-236-3301 × Phil 8477
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 99-1793：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D23 原图／官方图页

PHIL 99-2641

PH-c4113ca0e | 性状摘要 | SRA品种目录收录



育成来源：菲律宾；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾Sugar Regulatory Administration育种体系
亲本：Phil 83-129-3401 × Phil 8013
年份及口径：未核实
适用／评价区域：菲律宾，具体试验和适应区见独立品种卡

品种实物照片 | PHIL 99-2641：菲律宾SRA品种目录对应实物照片；独立说明卡提供亲本及鉴别性状，拍摄年月未注明。
株型直立至倾斜；生长较快；抽穗稀少。亲本据SRA原卡；形态随栽培条件变化，原卡未注明试验年份的产量未外推为一般水平。
待补：育成／发布年份
来源：PH-D21 原图／官方图页

VMC 76-16

PH-530bdf69d | 性状档案 | 商业品种目录收录



育成来源：菲律宾（VMC；印尼引进栽培）；用途：糖用
育种／来源单位：菲律宾育成；印尼登记单位PT Perkebunan Nusantara X (Persero)，原育种单位待核
亲本：未列明
年份及口径：2010-11-12（印尼发布）
适用／评价区域：印度尼西亚；当地条件见P3GI档案

品种实物照片 | VMC 76-16：P3GI品种独立档案所附照片；用于观察外观，拍摄日期与地点未注明。

萌芽：良好；初期生长：中等；茎径等级：中等；茎密度：中等；抽穗：不抽穗至零星抽穗；熟期：早中熟；纤维含量：± 15,04%；宿根性：强。数值和性状为印度尼西亚资料所述表现。

核查说明：产量和出糖率因新植／宿根及旱地／水田而异；未混合不同试验口径。P3GI记载其经CFC/ISO/20项目于2000—2005年从菲律宾引进；引进单位不等同于育种单位。

待补：亲本、育种单位

来源：ID-X033 [原图](#)／[官方图页](#)

日本 | 品种与材料档案

17条记录 · 核查日期2026-09-29

收录17个NARO公开条目，含糖用、饲料用、能源用途及编号材料。KR／KY编号的商业发布状态另行标注，不能全部视为已登记糖用品种。

KN00-114

JP-d9f2bad56 | 性状摘要 | NARO材料说明（编号材料发布状态另核）

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

糖分较高、品质较好，面向提早收获利用。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X060

KR12-316

JP-44e5edf6f | 性状摘要 | NARO材料说明（编号材料发布状态另核）

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

NARO于2025年公布的甘蔗材料，详细利用类别及发布状态需结合该页附件核实。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X055

KRFo93-1

JP-782e50a79 | 性状摘要 | NARO材料说明（编号材料发布状态另核）

育成来源：日本；用途：饲料

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

作为日本早期饲料甘蔗候选材料公布；初期长势和宿根再生较强，重在干物质产出。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X066

KTn03-54

JP-192455122 | 性状摘要 | NARO材料说明 (编号材料发布状态另核)

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构 (详见独立说明)

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

面向熊毛地区的茎重型甘蔗，制糖初期糖分较高。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X058

KY01-2044

JP-eff984bb8 | 性状摘要 | NARO材料说明 (编号材料发布状态另核)

育成来源：日本；用途：生物量／综合利用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构 (详见独立说明)

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

高生物量材料，强调多次宿根的全糖和蔗渣生产，可用于糖、乙醇联产技术研究。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X062

KY99-176

JP-e7c16d1d1 | 性状摘要 | NARO材料说明 (编号材料发布状态另核)

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构 (详见独立说明)

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

针对宫古地区夏植，强调收获便利性。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X059

Ni16

JP-b0a02f88c | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构 (详见独立说明)

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

初期长势和萌芽较好，春夏植产量较稳定，具有黑穗病抗性并适于宿根。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X071

Ni22

JP-376f149ba | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

萌芽和初期生长较好、糖分高、宿根产量较高，可用于12月早收。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X065

Ni23

JP-30869bd71 | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

春植、夏植与宿根产量表现较好，萌芽及伸长较强，在易发生夏旱地区具有利用价值。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X067

Ni27

JP-36b7526a8 | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

适用于宫古和八重山夏植；相对NiF8茎略粗、产量较高，茎叶整体偏绿色。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X063

NiN24

JP-60014ed91 | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

适用于冲绳南部夏植和早收，高单茎重，1至2月收获糖产量表现较好。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X064

NiTn18

JP-296612ab6 | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

低温条件下宿根萌芽较好，春植和宿根产量较稳定，适合NiF8低产环境补充利用。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X069

NiTn19

JP-4e4acbb39 | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

分蘖旺、茎数较多，有黑穗病抗性，适用于宿根及多种种植制度。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X070

NiTn20

JP-639cfc1d1 | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

萌芽与伸长较好，适用于春植、宿根及12月早收，并具有黑穗病抗性。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X068

しまのうしえ

JP-2a6bbe242 | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：饲料

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

面向奄美以南的饲料甘蔗；抗黑穗病，台风和干旱下干物质生产较稳定。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X061

はるのおうぎ

JP-415ebb66b | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：糖用

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

宿根萌芽强、有效茎数多；在西之表试验中，新植及宿根产量均较NiF8高，适用于种子岛相关生产条件。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X056

やえのうしえ

JP-b0ce2367c | 性状摘要 | NARO品种目录收录

育成来源：日本；用途：饲料

育种／来源单位：NARO及协作育种机构（详见独立说明）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：日本西南诸岛；各材料适用地不同

图片：尚缺可确认的品种照片

面向西南诸岛的饲料甘蔗；黑穗病抗性强、延迟收获仍较抗倒伏，适应机械收获。

核查说明：网页公表日期不能自动作为品种登记日期。独立页中的成果附件可能含鉴别图，未取得身份清楚图片前不配普通蔗田照片。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：JP-X057

巴基斯坦 | 品种与材料档案

14条记录 · 核查日期2026-09-29

主要据SRDB独立档案，并将CoJ84、CP77-400等直接引种材料归入其育成来源国。YTFG236、NSG59、SPF93的育成来源待核，暂按资料来源归组；禁止或未批准状态如实保留。

CPF-237

PK-359aa28b0 | 性状档案 | 引进种子后本地选育



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-237：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。
由美国Canal Point引入杂交种子后进行单株选择，2000年推广；早熟、较粗茎。
待补：亲本、育成／发布年份、育种单位
来源：PK-X053 原图／官方图页

CPF-246

PK-bc19661c0 | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2011
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-246：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。
2011年发布，中熟，含糖可在正常收获季持续累积；较抗倒、宿根较好，对高投入条件响应较好。
待补：亲本、育种单位
来源：PK-X050 原图／官方图页

CPF-247

PK-57cb95834 | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2011
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-247：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。
2011年发布，中熟、中等茎径，长势和宿根较好，较抗倒伏；推荐区排除河滨地带。
待补：亲本、育种单位
来源：PK-X049 原图／官方图页

CPF-248

PK-a17277c37 | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2013
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-248：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。

2013年发布，中熟、中等茎径、分蘖较好、较抗倒；推荐区排除旁遮普河滨地带。

待补：亲本、育种单位

来源：PK-X048 [原图](#)／[官方图页](#)

CPF-249

PK-f850dd05e | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2016
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-249：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。

2016年发布，中熟；原站报告有一定耐盐性，对赤腐病中抗。

待补：亲本、育种单位

来源：PK-X047 [原图](#)／[官方图页](#)

CPF-250

PK-d9a7c7ce3 | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2019
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-250：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。

2019年发布，早熟，分蘖较好；原站报告对盐分有一定耐受，对赤腐病中抗。

待补：亲本、育种单位

来源：PK-X046 [原图](#)／[官方图页](#)

CPF-251

PK-9c485edc6 | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2019
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-251：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。

2019年发布，早熟、细茎多，较适应低肥力土壤，初期生长和宿根较好。

待补：亲本、育种单位

来源：PK-X045 [原图](#)／[官方图页](#)

CPF-252

PK-ad4b3b4c9 | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2019
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-252：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。
2019年发布，细茎多、较晚熟、宿根较好且不易倒伏；当地建议适于9月种植。

待补：亲本、育种单位
来源：[PK-X044 原图](#)／[官方图页](#)

CPF-253

PK-d7596e511 | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2019
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | CPF-253：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。
2019年发布，早熟、细茎多，较直立，适用于低肥力土壤；分蘖和宿根较好。

待补：亲本、育种单位
来源：[PK-X043 原图](#)／[官方图页](#)

NSG-59

PK-e77fdb49 | 性状档案 | 未获批准材料



育成来源：原始来源待核（巴基斯坦发布／栽培）；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | NSG-59：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。
原站明确为未经批准却有商业种植的材料；株型直立，中至粗茎，宿根较强。

核查说明：此记录按资料提供国暂编，不计作已证明的该国自主育种成果。
待补：亲本、育成／发布年份、育种单位
来源：[PK-X041 原图](#)／[官方图页](#)

SPF-213

PK-d529503e1 | 性状档案 | 已发布



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2002
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | SPF-213：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。
2002年发布，中熟、中等茎径，宿根表现中等，有轻度倒伏倾向；当地报告抗赤腐和黑穗病。

待补：亲本、育种单位
来源：[PK-X051 原图](#)／[官方图页](#)

SPF-234

PK-c7aaa920e | 性状档案 | 引进种子后本地选育



育成来源：巴基斯坦；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2002
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | SPF-234：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。


由巴西引入的杂交种子在当地选择，2002年发布；中熟、中等茎径，生长较好。

待补：亲本、育种单位

来源：PK-X052 原图／官方图页

SPF-93

PK-c3cfb6a98 | 性状档案 | 未获批准材料



育成来源：原始来源待核（巴基斯坦发布／栽培）；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | SPF-93：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。

原站明确为未经批准却有商业种植的材料；粗茎、自脱叶、宿根较强，低糖及成熟问题明显。

核查说明：此记录按资料提供国暂编，不计作已证明的该国自主育种成果。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位

来源：PK-X040 原图／官方图页

YTFG-236

PK-6295814c9 | 性状档案 | 当地发布，原始来源待核



育成来源：原始来源待核（巴基斯坦发布／栽培）；用途：糖用
育种／来源单位：旁遮普SRI／SRDB资料记录；具体育种主体待核
亲本：未列明
年份及口径：2024
适用／评价区域：巴基斯坦旁遮普（该来源评价地）

品种实物照片 | YTFG-236：巴基斯坦SRDB独立品种说明配图；照片反映当地生长状态，拍摄日期未注明。

2024年在当地发布，早熟、分蘖及宿根表现较好，较直立且自脱叶；材料原始来源需进一步核实。

核查说明：此记录按资料提供国暂编，不计作已证明的该国自主育种成果。

待补：亲本、育种单位

来源：PK-X042 原图／官方图页

孟加拉国 | 品种与材料档案

38条记录 · 核查日期2026-09-29

取得官方数字标本馆38个甘蔗lsd／BSRI Akh名称；甜菜条目已排除。多项详情页无法取得完整内容，目前以身份索引为主，不能假装具备性状说明或图片。

BSRI Akh 41

BD-8c874981d | 名称／身份 | 机构发布清单记录
育成来源：孟加拉国；用途：糖用
育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核
图片：详情页待补图
大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。
核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：BD-LIST 原图／官方图页

BSRI Akh 42

BD-979efca3c | 名称／身份 | 机构发布清单记录
育成来源：孟加拉国；用途：糖用
育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核
图片：详情页待补图
大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。
核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：BD-LIST 原图／官方图页

BSRI Akh 43

BD-0a8b25085 | 名称／身份 | 机构发布清单记录
育成来源：孟加拉国；用途：糖用
育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核
图片：详情页待补图
大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。
核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：BD-LIST 原图／官方图页

BSRI Akh 44

BD-3ee49255a | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

BSRI Akh 45

BD-fa1cc8f76 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

BSRI Akh 46

BD-c40c091df | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 1/53 (Nota Kushir)

BD-98b349efb | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 10/54

BD-bffbbc25f | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 11/58

BD-7a1786e66 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 12/58

BD-322c651f8 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 13/58

BD-735e84c3b | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 14/60

BD-dfce40b59 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 15

BD-3aa50e7d3 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 16

BD-7ca1f3166 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 2/54

BD-41f2419a2 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 22

BD-36d267998 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 24

BD-142dabd67 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 25

BD-9db537cd4 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 26

BD-4c3ab95fd | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 27

BD-1fe7e3a3d | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 28

BD-33045a584 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 29

BD-711e13405 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 3/54

BD-db7a4c95d | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 30

BD-44cc163e0 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 31

BD-e8e493484 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 32

BD-05c4acb94 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 33

BD-bd3cd6937 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 34

BD-9a20f2088 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 35

BD-7189e651a | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 36

BD-28ea84251 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 37

BD-d1473da3c | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 38

BD-05f6b28fb | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 39

BD-c67ed2c50 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 4/55

BD-8402b583b | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 40

BD-8017243d8 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 6/66

BD-a5ff708ca | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：[BD-LIST 原图](#)／[官方图页](#)

Isd 7/57

BD-35b480f57 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：BD-LIST [原图](#)／[官方图页](#)

Isd 8/57

BD-8f7917461 | 名称／身份 | 机构发布清单记录

育成来源：孟加拉国；用途：糖用

育种／来源单位：Bangladesh Sugarcrop Research Institute（BSRI）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：孟加拉国；具体适应区待核

图片：详情页待补图

大学作物数字标本馆的BSRI已发布品种清单收录本品种。品种详情页本次未成功读取，亲本、熟期、产量和抗性均保留待补，不以同系列其他品种的数据代填。

核查说明：没有把甜菜品种BSRI Sugarbeet计入甘蔗。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：BD-LIST [原图](#)／[官方图页](#)

斯里兰卡 | 品种与材料档案

26条记录 · 核查日期2026-09-29

合并4个2003系列发布说明与机构育成品种名称索引。保留来源中SL、SLS等具体名称，不擅自合并疑似拼写或编号差异。

SL 00 354

LK-d5f16b2a4 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 00 603

LK-5d259698e | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 00 652

LK-c9f3239bd | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 00 95

LK-28a21bd9f | 名称/身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种/来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用/评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片


斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成/发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 03 1025

LK-c22c574e3 | 性状档案 | 2023新品种说明收录



育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种/来源单位：Sugarcane Research Institute, Uda Walawe

亲本：SL 71 16（多父本混合授粉）

年份及口径：2003（杂交系列）；2023（说明）

适用/评价区域：斯里兰卡Uda Walawe、Pelwatta、Hingurana试验

品种实物照片 | SL 03 1025：斯里兰卡SRI 2023说明中的节间/芽/叶部鉴别实物照片。

12至14个月中熟；黄褐色茎、节间弯曲、五角形芽；宿根较好，黑穗病筛选高抗，叶灼病筛选抗。

来源：BASE-LK2 · PDF第4页 原图/官方图页

SL 03 1077

LK-17ffa005f | 性状档案 | 2023新品种说明收录



育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种/来源单位：Sugarcane Research Institute, Uda Walawe

亲本：PH 86 147（多父本混合授粉）

年份及口径：2003（杂交系列）；2023（说明）

适用/评价区域：斯里兰卡Uda Walawe、Pelwatta、Hingurana试验


品种实物照片 | SL 03 1077：斯里兰卡SRI 2023说明中的节间/芽/叶部鉴别实物照片。

12至14个月中熟；棕色较粗茎，芽较大而偏圆；宿根较好，但黑穗病筛选中感、叶灼病筛选高感。

来源：BASE-LK2 · PDF第5页 原图/官方图页

SL 03 336

LK-cb6795422 | 性状档案 | 2023新品种说明收录



育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种/来源单位：Sugarcane Research Institute, Uda Walawe

亲本：CP 69 1052（自交）

年份及口径：2003（杂交系列）；2023（说明）

适用/评价区域：斯里兰卡Uda Walawe、Pelwatta、Hingurana试验

品种实物照片 | SL 03 336：斯里兰卡SRI 2023说明中的节间/芽/叶部鉴别实物照片。

11至13个月中熟；绿黄色茎，节间圆筒形；宿根较好。筛选中高抗黑穗病和叶灼病，白叶病田间发生随地点明显变化。

来源：BASE-LK2 · PDF第2页 原图/官方图页

SL 03 983

LK-8b600b844 | 性状档案 | 2023新品种说明收录



育成来源：斯里兰卡；用途：糖用
育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Uda Walawe
亲本：SL 81 09（多父本混合授粉）
年份及口径：2003（杂交系列）；2023（说明）
适用／评价区域：斯里兰卡Uda Walawe、Pelwatta、Hingurana试验

品种实物照片 | SL 03 983：斯里兰卡SRI 2023说明中的节间／芽／叶部鉴别实物照片。
10至12个月早熟；绿黄色茎、较直立、多毛，自脱叶较差；宿根较好，叶灼病筛选为中感。
来源：BASE-LK2 · PDF第3页 原图／官方网页

SL 04 624

LK-b33127ac7 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用
育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：斯里兰卡
图片：尚缺可确认的品种照片
斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：LK-DEVELOPED

SL 71 03

LK-9dea5e126 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用
育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：斯里兰卡
图片：尚缺可确认的品种照片
斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：LK-DEVELOPED

SL 71 30

LK-98c51702b | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用
育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用／评价区域：斯里兰卡
图片：尚缺可确认的品种照片
斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。
待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：LK-DEVELOPED

SL 83 06

LK-540a159d1 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 86 13

LK-7bfebc271 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 88 116

LK-67ad67b3c | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 89 1673

LK-d14383dcf | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 90 6237

LK-78c4e9f41 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 92 4918

LK-4d42d3eff | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 92 4997

LK-bf5ab976b | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 92 5588

LK-ad65c8890 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 95 4033

LK-fc09a0dc0 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 95 4430

LK-35ecad56e | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 95 4443

LK-b52bd24fb | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 96 128

LK-3bd449a0e | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI“已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 96 328

LK-015966c11 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI “已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SL 98 2524

LK-05aa72b82 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI “已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

SLS 88 238

LK-2e1167830 | 名称／身份 | 机构育成品种目录收录

育成来源：斯里兰卡；用途：糖用

育种／来源单位：Sugarcane Research Institute, Sri Lanka

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斯里兰卡

图片：尚缺可确认的品种照片

斯里兰卡SRI “已育成品种”官方目录收录；该目录只列名称，品种编号不直接转换为发布日期，详细性状及图片待补。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：LK-DEVELOPED

斐济 | 品种与材料档案

14条记录 · 核查日期2026-09-29

依据SRIF商业品种目录收录14个名称，其中部分有熟期与适应性说明。缺亲本、照片或历史发布信息的条目保留缺项。

Aiwa

FJ-73c841eb8 | 名称／身份 | 官方说明目录记录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业体系，具体来源待核

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

SRIF品种说明目录中列有本材料的独立说明。本次未取得可读文件，暂保留为身份索引，不套用其他品种的熟期或产量。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：FJ-INFO

Beqa

FJ-8d327057c | 名称／身份 | 官方说明目录记录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业体系，具体来源待核

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

SRIF品种说明目录中列有本材料的独立说明。本次未取得可读文件，暂保留为身份索引，不套用其他品种的熟期或产量。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：FJ-INFO

Galoa

FJ-07a81e420 | 性状摘要 | SRIF商业品种目录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业育种体系（确切亲本待核）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

中熟，节间中部略膨大，目录针对盐分影响土壤推荐。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片

来源：FJ-CACHED

Kaba

FJ-7e1072586 | 性状摘要 | SRIF商业品种目录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业育种体系（确切亲本待核）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

中熟，适用于中等肥力及表土较深的贫瘠地。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片

来源：FJ-CACHED

Kiuva

FJ-ea58b5c8e | 名称／身份 | 官方说明目录记录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业体系，具体来源待核

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

SRIF品种说明目录中列有本材料的独立说明。本次未取得可读文件，暂保留为身份索引，不套用其他品种的熟期或产量。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：FJ-INFO

LF91-1925

FJ-549caacf7 | 名称／身份 | 官方说明目录记录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业体系，具体来源待核

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

SRIF品种说明目录中列有本材料的独立说明。本次未取得可读文件，暂保留为身份索引，不套用其他品种的熟期或产量。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：FJ-INFO

Mali

FJ-daa6a489d | 性状摘要 | SRIF商业品种目录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业育种体系（确切亲本待核）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

晚熟，适用于中低肥力土壤，叶片较宽且易倒伏。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片

来源：FJ-CACHED

Mana

FJ-1eab2e778 | 性状摘要 | SRIF商业品种目录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业育种体系（确切亲本待核）

亲本：未列明

年份及口径：1972

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

中晚熟，适应较贫瘠土壤并有一定耐旱性。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片

来源：FJ-CACHED

Naidiri

FJ-bb6f516b8 | 性状摘要 | SRIF商业品种目录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业育种体系（确切亲本待核）

亲本：未列明

年份及口径：2000

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

早熟，适应富氮较肥沃土壤，收获季含糖保持较好。

待补：亲本、育种单位、品种实物照片

来源：FJ-CACHED

Qamea

FJ-20497ee15 | 名称／身份 | 官方说明目录记录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业体系，具体来源待核

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

SRIF品种说明目录中列有本材料的独立说明。本次未取得可读文件，暂保留为身份索引，不套用其他品种的熟期或产量。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：FJ-INFO

Ragnar

FJ-79f78b725 | 性状摘要 | SRIF商业品种目录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业育种体系（确切亲本待核）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

早中熟，适用于中等肥力土壤，蔗丛和茎数较多，叶片较脆。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片

来源：FJ-CACHED

Vatu

FJ-91700afde | 性状摘要 | SRIF商业品种目录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业育种体系（确切亲本待核）

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

中晚熟，适用于中低肥力土壤，茎皮较硬。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片

来源：FJ-CACHED

Viwa

FJ-7806a44b3 | 名称／身份 | 官方说明目录记录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业体系，具体来源待核

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

SRIF品种说明目录中列有本材料的独立说明。本次未取得可读文件，暂保留为身份索引，不套用其他品种的熟期或产量。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：FJ-INFO

Waya

FJ-31d9fd9f3 | 名称／身份 | 官方说明目录记录

育成来源：斐济；用途：糖用

育种／来源单位：斐济糖业体系，具体来源待核

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：斐济

图片：尚缺可确认的品种照片

SRIF品种说明目录中列有本材料的独立说明。本次未取得可读文件，暂保留为身份索引，不套用其他品种的熟期或产量。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：FJ-INFO

肯尼亚 | 品种与材料档案

19条记录 · 核查日期2026-09-29

以2022年官方国家品种表中的19个KEN材料为主体。该来源内的外来育成材料及东非合作材料另按来源归组；不能代表2026年最新全部清单。

KEN 00-13

KE-e61bcd7b | 性状摘要 | 2022国家名录记录
育成来源：肯尼亚；用途：糖用
育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）
亲本：未列明
年份及口径：2014（肯尼亚发布）
适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录
图片：尚缺可确认的品种照片
15至17个月；早熟、较高糖分和蔗产量。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。
待补：亲本、品种实物照片
来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 00-3548

KE-3de9ddf1c | 性状摘要 | 2022国家名录记录
育成来源：肯尼亚；用途：糖用
育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）
亲本：未列明
年份及口径：2014（肯尼亚发布）
适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录
图片：尚缺可确认的品种照片
16至18个月；宿根较好。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。
待补：亲本、品种实物照片
来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 00-3811

KE-0701b1ec2 | 性状摘要 | 2022国家名录记录
育成来源：肯尼亚；用途：糖用
育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）
亲本：未列明
年份及口径：2014（肯尼亚发布）
适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录
图片：尚缺可确认的品种照片
16至18个月；较高蔗产量和糖分。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。
待补：亲本、品种实物照片
来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 00-5873

KE-105f8041c | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2014（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

16至18个月；原表列黑穗病反应良好。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-121

KE-e639998df | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2011（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

15至17个月；早熟高糖。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-216

KE-5beb658a7 | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2002（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

15至19个月；较早熟。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-219

KE-7e539c3d5 | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2002（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

15至19个月；高糖。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-247

KE-9212604dd | 性状摘要 | 2022国家名录记录
育成来源：肯尼亚；用途：糖用
育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）
亲本：未列明
年份及口径：2002（肯尼亚发布）
适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录
图片：尚缺可确认的品种照片
15至19个月；较早熟。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。
待补：亲本、品种实物照片
来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-401

KE-abd775800 | 性状摘要 | 2022国家名录记录
育成来源：肯尼亚；用途：糖用
育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）
亲本：未列明
年份及口径：2002（肯尼亚发布）
适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录
图片：尚缺可确认的品种照片
15至19个月；高糖。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。
待补：亲本、品种实物照片
来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-472

KE-7c2be59ec | 性状摘要 | 2022国家名录记录
育成来源：肯尼亚；用途：糖用
育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）
亲本：未列明
年份及口径：2007（肯尼亚发布）
适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录
图片：尚缺可确认的品种照片
17至19个月；粗茎、宿根较好、适应面广。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。
待补：亲本、品种实物照片
来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-493

KE-9d815d07a | 性状摘要 | 2022国家名录记录
育成来源：肯尼亚；用途：糖用
育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）
亲本：未列明
年份及口径：2011（肯尼亚发布）
适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录
图片：尚缺可确认的品种照片
15至17个月；分蘖较多、蔗产量较高。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。
待补：亲本、品种实物照片
来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-601

KE-0b84064a4 | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2011（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

15至17个月；早熟、高糖。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-62

KE-045fea2ea | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2007（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

17至20个月；高糖，黑穗病中抗。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-737

KE-9c2a34507 | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2002（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

16至20个月；耐黑穗病。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 82-808

KE-711f33f7e | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2002（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

15至19个月；耐逆境。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 98-367

KE-10126c6b4 | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2014（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

15至17个月；早熟。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 98-530

KE-c6bb4f9c0 | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2014（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

16至18个月；高糖。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 98-533

KE-44c73ba0c | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2014（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

16至18个月；高糖、抗黑穗病。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

KEN 98-551

KE-b661486d7 | 性状摘要 | 2022国家名录记录

育成来源：肯尼亚；用途：糖用

育种／来源单位：KESREF（肯尼亚糖业研究体系）

亲本：未列明

年份及口径：2014（肯尼亚发布）

适用／评价区域：肯尼亚，分区见名录

图片：尚缺可确认的品种照片

16至18个月；高糖。依据肯尼亚2022国家品种名录；熟期以当地条件为前提。

待补：亲本、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第20页

哥斯达黎加 | 品种与材料档案

3条记录 · 核查日期2026-09-29

收录3个LAICA独立品种材料。LAICA 07-20所附为官方性状表，不是品种实物照片；引入的Mex和B系列分别归入墨西哥与巴巴多斯。

LAICA 07-20

CR-f91043a6b | 性状摘要 | 区域商业品种目录收录

LAICA 07-20 (H 77-4643 x B76-259)		
Datos de Producción	Características	
Tallas medidas/m ²	12	Habla de crecimiento erecto. El color del tallo expuesto al sol es amarillento y no muy alto al sol.
Floración %	0	La yema es de forma triangular, con un pedúnculo prominente, de tamaño y ancho medio.
Corchos	No presente	
% Fibra	13	
Promedio rendimiento agrícola: 1" caña/m ²	80 a 90	se cultiva en suelos fértiles y húmedos, de origen volcánico en altura de 800 a 1000 metros. Se ha observado niveles muy bajos de defoliación por Psikun negro (<i>Phaeum nomophila</i>).
1" caña/hora		
Promedio rendimiento industrial: kg caña/r/1		
Maduración	Tarda	
Susceptibilidad herbívoros		
	Media	
"tonedales máficos"		
"helacteria"		

厄瓜多尔 | 品种与材料档案

2条记录 · 核查日期2026-09-29

ECU01、EC02据官方知识产权资料确认身份。原来源未充分给出农艺性状、亲本与对应实物照片，仍为待补的身份条目。

EC-02

EC-cfcba40d2 | 名称／身份 | 育成及登记报道记录

育成来源：厄瓜多尔；用途：糖用

育种／来源单位：CINCAE

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：厄瓜多尔

图片：尚缺可确认的品种照片

厄瓜多尔知识产权主管机关报道CINCAE取得并登记的品种。本条确认本地育种与登记身份；不把报道中的行业平均增产数值套到单一品种。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：EC-IP

ECU-01

EC-b909488c4 | 名称／身份 | 育成及登记报道记录

育成来源：厄瓜多尔；用途：糖用

育种／来源单位：CINCAE

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：厄瓜多尔

图片：尚缺可确认的品种照片

厄瓜多尔知识产权主管机关报道CINCAE取得并登记的品种。本条确认本地育种与登记身份；不把报道中的行业平均增产数值套到单一品种。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：EC-IP

委内瑞拉 | 品种与材料档案

2条记录 · 核查日期2026-09-29

V系列条目来自Cenicaña历史目录对育成来源的明确记录，不能代表委内瑞拉国家品种总录。

V 71-49

VE-65aec0db5 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案
育成来源：委内瑞拉（哥伦比亚试验）；用途：糖用
育种／来源单位：原目录品种来源机构（待细核）
亲本：L 60-25 × ?
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区
图片：官方品种图页入口
Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
待补：品种实物照片
来源：CO-CAT · PDF第84页 原图／官方图页

V 71-51

VE-ef04edd0c | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案
育成来源：委内瑞拉（哥伦比亚试验）；用途：糖用
育种／来源单位：原目录品种来源机构（待细核）
亲本：L 60-25 × ?
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区



品种实物照片 | V 71-51蔗茎／节部鉴别实物图；Cenicaña《Catálogo de variedades》第二版（2003）。图片为历史档案。
Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。
来源：CO-CAT · PDF第86页 原图／官方图页

多米尼加共和国 | 品种与材料档案

1条记录 · 核查日期2026-09-29

RD材料来自Cenicaña历史目录的来源记录，尚未完成多米尼加全国历年品种资料收集。

RD 75-11

DO-51510a296 | 亲本／形态档案 | 2003历史品种档案



育成来源：多米尼加共和国（哥伦比亚试验）；用途：糖用
育种／来源单位：原目录品种来源机构（待细核）
亲本：CB 38-22 × CP 57-603
年份及口径：2003（目录）
适用／评价区域：哥伦比亚Cauca河谷试验生态区

品种实物照片 | RD 75-11蔗茎／节部鉴别实物图；Cenicaña《Catálogo de variedades》第二版（2003）。图片为历史档案。

Cenicaña 2003年第二版目录收录的材料。形态记录：圆筒形节间。原页提供形态、农艺、病害和当地试验评价；这些历史试验结果不作为2026年的推广结论。

来源：CO-CAT · PDF第82页 原图／官方图页

圭亚那 | 品种与材料档案

1条记录 · 核查日期2026-09-29

由官方境外品种表确认D系列材料，国家归属按来源说明填写；圭亚那本国完整品种册尚未纳入。

D8484

GY-f77feeba9 | 性状摘要 | 境外引进栽培记录

育成来源：圭亚那；用途：糖用

育种／来源单位：圭亚那糖业体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：肯尼亚（此来源评价地）

图片：尚缺可确认的品种照片

圭亚那来源；肯尼亚2007年发布记录，成熟期14至16个月，名录评价抗黑穗病。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片

来源：KE-NVL · PDF第19页

巴巴多斯 | 品种与材料档案

1条记录 · 核查日期2026-09-29

由LAICA档案确认B77-95及来源，巴巴多斯／区域WICSCBS历年B系列尚未形成完整清单。

B 77-95

BB-2a142e408 | 性状摘要 | 区域商业品种目录收录

B 77-95	
品种名称	B 77-95
育种者	LAICA, Barbados
注册年份	1977
品种类型	甘蔗
用途	糖用
亲本	未列明
年份及口径	未核实
适用/评价区域	哥斯达黎加高地 (该来源评价地)



育成来源：巴巴多斯；用途：糖用

育种／来源单位：原育种机构待核

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：哥斯达黎加高地（该来源评价地）

品种实物照片 | B 77-95：LAICA区域品种页面所配实物图；拍摄年月未注明。

早熟，在当地约600至1200米种植，需中高肥力和良好水分；本来源为哥斯达黎加引种评价。

待补：亲本、育成／发布年份、育种单位

来源：CR-LIST [原图](#)／[官方图页](#)

东非区域协作 | 品种与材料档案

4条记录 · 核查日期2026-09-29

EA材料按区域协作专题单列，避免在证据不足时全部归为肯尼亚本国育成。该专题不是一个国家。

EAK 69-47

EA-aeed168c4 | 名称/身份 | 区域协作材料
育成来源：东非区域协作（育成地点待核）；用途：糖用
育种/来源单位：东非协作/KESREF体系
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用/评价区域：肯尼亚及东非试验记录
图片：尚缺可确认的品种照片
东非协作品种，肯尼亚国家名录收录。源表涉及EAC、KESREF和坦桑尼亚关系；未以EAK前缀直接断言某一国家独立育成。
待补：亲本、育成/发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：KE-NVL · PDF第19页

EAK 70-97

EA-e866e36a2 | 名称/身份 | 区域协作材料
育成来源：东非区域协作（育成地点待核）；用途：糖用
育种/来源单位：东非协作/KESREF体系
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用/评价区域：肯尼亚及东非试验记录
图片：尚缺可确认的品种照片
东非协作品种，肯尼亚国家名录收录。源表涉及EAC、KESREF和坦桑尼亚关系；未以EAK前缀直接断言某一国家独立育成。
待补：亲本、育成/发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：KE-NVL · PDF第19页

EAK 71-402

EA-ad265edde | 名称/身份 | 区域协作材料
育成来源：东非区域协作（育成地点待核）；用途：糖用
育种/来源单位：东非协作/KESREF体系
亲本：未列明
年份及口径：未核实
适用/评价区域：肯尼亚及东非试验记录
图片：尚缺可确认的品种照片
东非协作品种，肯尼亚国家名录收录。源表涉及EAC、KESREF和坦桑尼亚关系；未以EAK前缀直接断言某一国家独立育成。
待补：亲本、育成/发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域
来源：KE-NVL · PDF第19页

EAK 73-335

EA-28a7d91df | 名称／身份 | 区域协作材料

育成来源：东非区域协作（育成地点待核）；用途：糖用

育种／来源单位：东非协作／KESREF体系

亲本：未列明

年份及口径：未核实

适用／评价区域：肯尼亚及东非试验记录

图片：尚缺可确认的品种照片

东非协作品种，肯尼亚国家名录收录。源表涉及EAC、KESREF和坦桑尼亚关系；未以EAK前缀直接断言某一国家独立育成。

待补：亲本、育成／发布年份、品种实物照片、农艺性状与适宜区域

来源：KE-NVL · PDF第19页

品种来源索引

以下205项来源与每条品种档案的来源编号对应。PDF页码指文件页序。原育种正文来源见原文目录；本节仅列新增品种来源。

AR-X008 | TUC 00-19
<https://www.eeaoc.gob.ar/tuc-00-19/>

AR-X009 | TUC 02-22
<https://www.eeaoc.gob.ar/tuc-02-22/>

AR-X010 | TUC 03-12
<https://www.eeaoc.gob.ar/tuc-03-12/>

AR-X011 | TUC 06-7
<https://www.eeaoc.gob.ar/tuc-06-7/>

AU-SPRING | Cane Matters Spring 2025
<https://sugarresearch.com.au/wp-content/uploads/2026/01/Cane-Matters-Spring-2025.pdf>

AU-SURVEY | SRA grower survey 2024
<https://sugarresearch.com.au/wp-content/uploads/2025/05/SRA-Grower-Survey-2024-Final-Report.pdf>

BASE-LK2 | 斯里兰卡2023品种说明
<https://sugarres.lk/wp-content/uploads/2023/05/Variety-Notes-2023.pdf>

BASE-TH1 | 泰国Khon Kaen 3
<https://doaplant.doa.go.th/RecFront/PlantDetail/271>

BASE-TH2 | 泰国Nakhon Sawan 1
<https://doaplant.doa.go.th/RecFront/PlantDetail/458>

BD-LIST | BSRI品种图鉴
<https://dhcrop.bsmrau.net/varieties-released/varieties-released-by-bsri/>

BR-D04 | RIDESA: 55 Years of RB Sugarcane Varieties / 35 Years RIDESA (2025英文版)
https://www.ridesa.com.br/_files/ugd/242756_a4f02a276c02456db3c72f9a81077f50.pdf

CN-2025 | 2025国家优良品种推广目录
<https://zys.moa.gov.cn/gzdt/202507/P020250721568526002533.pdf>

CN-LIN | 甘蔗品种亲本研究表
<https://zwxb.chinacrops.org/article/2018/0496-3490/0496-3490-44-5-723/T4-0496-3490-44-5-723.html>

CN-REG | 2018–2025登记目录
<https://nercs.fafu.edu.cn/info/1030/10421.htm>

CO-CAT | Cenicaña品种目录
https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_31/st_31.pdf

CR-LIST | LAICA区域品种
<https://servicios.laica.co.cr/laica-asistencia/index.php/Asistencia/items/99%3A260%3A220346>

CU-TRIAL | Cuban yellowing trial
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1659-13212012000100012&script=sci_arttext

EC-IP | 厄瓜多尔知识产权主管机关: CINCAE品种登记
<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/el-cincae-obtiene-nuevas-variedades-de-cana-y-las-registra-en-el-iepi/>

FJ-CACHED | SRIF Commercial Varieties (官方检索缓存)
<https://www.srif.net.fj/page15>

FJ-INFO | SRIF Resources 品种说明目录 (官方检索缓存)
<https://www.srif.net.fj/page14>

FR-D01P | Consultez en ligne
<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2023/11/www.ercane.re-fiche-varietale-r590-a5-2023.pdf>

FR-D02P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2023/11/www.ercane.re-fiche-varietale-r589-a5-2023.pdf>

FR-D03P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2023/11/www.ercane.re-fiche-varietale-r588-a5-2023.pdf>

FR-D04P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r586.pdf>

FR-D05P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r585.pdf>

FR-D06P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r584.pdf>

FR-D07P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r583.pdf>

FR-D08P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r582.pdf>

FR-D09P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r581.pdf>

FR-D10P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r579.pdf>

FR-D11P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r577.pdf>

FR-D12P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r575.pdf>

FR-D13P | Consultez en ligne

<https://www.ercane.re/wp-content/uploads/2019/11/ercane.re.nathan.re-r570.pdf>

FR-LIST | eRcane品种目录

<https://www.ercane.re/nos-varietes/>

ID-X012 | PSBK 051

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/0ya0Ao1NJD

ID-X013 | PS 851

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/2CeR9n0g7R

ID-X014 | CENNING

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/2MZIYMKV5O

ID-X015 | KK (Kidang Kencana)

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/3oXCAUKYSX

ID-X016 | PS 092

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/5llkUzUO8F

ID-X017 | PS 864

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/9F4X0n33bm

ID-X018 | TLH 1

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/aPrwLdvFl8

ID-X019 | PSKA 095

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/bkBsEXnWKb

ID-X020 | PSNX 052

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/dOk2Eg0Sgo

ID-X021 | PSJT 941

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/eUIJLcpgl

ID-X022 | BL (Bululawang)

https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/l2fJE7Tre5

ID-X023 PS 881	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/NscOzK7ebq
ID-X024 PSBM 971	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/nu6FbMTt5d
ID-X025 PSKA 942	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/nUJtCoIVMN
ID-X026 PS 882	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/oniYnRJfpD
ID-X027 PSJK 922	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/P97TV5FxFT
ID-X028 PSNXI 943	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/PLfNnQ5OTL
ID-X029 PSBM 901	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/PWF06SCJlq
ID-X030 PSBK 061	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/QoYWDSjOu7
ID-X031 KENTUNG	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/RXtbDWRwv9
ID-X032 PSKA 062	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/un3IHEjwJD
ID-X033 VMC 76-16	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/vKtUAREls7
ID-X034 PS 862	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/Vl1xHtA64V
ID-X035 PS 091	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/w9dwDpDXBn
ID-X036 PSDK 923	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/weIGHYMHbU
ID-X037 PS 094	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/Xdsa5jq47O
ID-X038 PS Nusantara 053	https://varietasp3gi.com/index.php/Webview/Varietas_komersial/article/Ym41YKZSqF
IN-D04 Co 11015 (Athulya)	https://sugarcane.res.in/?page_id=4175
IN-NEW ICAR选育成果	https://sugarcane.res.in/?page_id=3539
IN-PVP PPVFR registered varieties	https://plantauthority.gov.in/node/3044
JP-X055 KR12-316	https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/169835.html
JP-X056 はるのおうぎ	https://www.naro.go.jp/collab/breed/laboratory/karc/134594.html
JP-X057 やえのうしえ	https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/119860.html
JP-X058 KTn03-54	https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/048453.html
JP-X059 KY99-176	https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/043921.html

JP-X060 | KN00-114

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/laboratory/karc/025252.html>

JP-X061 | しまのうしえ

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/012890.html>

JP-X062 | KY01-2044

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001492.html>

JP-X063 | Ni27

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001366.html>

JP-X064 | NiN24

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001385.html>

JP-X065 | Ni22

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001396.html>

JP-X066 | KRf093-1

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001397.html>

JP-X067 | Ni23

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001398.html>

JP-X068 | NiTn20

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001402.html>

JP-X069 | NiTn18

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001406.html>

JP-X070 | NiTn19

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001407.html>

JP-X071 | Ni16

<https://www.naro.go.jp/collab/breed/0200/0202/001415.html>

KE-NVL | Kenya national variety list 2022

https://kephis.org/images/pdf-files/UPDATED_2022_JANUARY_NATIONAL_VARIETY_LIST.pdf

LK-DEVELOPED | SRI Varieties Developed (官方目录)

<https://sugarres.lk/research-development/varieties-developed/>

MU-LIST | MSIRI品种说明

<https://www.msiri.mu/index.php?langue=eng&rub=31>

MU-X000 | M 1256/04

<https://www.msiri.mu/UserFiles/File/sugarcane%20pamphlets/M%201256-04.pdf>

MU-X001 | M 1989/99

<https://www.msiri.mu/UserFiles/File/sugarcane%20pamphlets/M%201989-99.pdf>

MU-X003 | M 683/99

<https://www.msiri.mu/UserFiles/File/sugarcane%20pamphlets/M%20683-99.pdf>

MU-X004 | M 2502/99

<https://www.msiri.mu/UserFiles/File/sugarcane%20pamphlets/M%202502-99.pdf>

MU-X005 | M 1392/00

<https://www.msiri.mu/UserFiles/File/sugarcane%20pamphlets/M%201392-00.pdf>

MU-X006 | M 1002/02

<https://www.msiri.mu/UserFiles/File/sugarcane%20pamphlets/M%201002-02.pdf>

MU-X007 | M 915/05

<https://www.msiri.mu/UserFiles/File/sugarcane%20pamphlets/M%20915-05.pdf>

PH-D0 | PHIL 2006-2289 (Phil 98-258-3403 x Phil 8477)

https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/M0djwHj7JzDty0u/path_desc

PH-D1 | PHIL 2006-1899 (PHIL 92-0051 x Phil 93-2349)

https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/AzoellmVBDtYR9f/path_desc

PH-D10		PHIL 2000-1419 (Phil 88-121-0363 X Phil 92-1043)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/XUBNryblBFvz6sd/path_desc		
PH-D11		PHIL 99-0925 (Phil 92-29-0535 x Phil 91-182-1217)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/1jxAkpo3LImFOMT/path_desc		
PH-D12		PHIL 2005-1197 (VMC 90-239 x Phil 94-0913)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/zhqXFzN2XqTnLGX/path_desc		
PH-D13		PHIL 2005-0645 (Phil 78-86-3981 x Phil 93-65-0775)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/JhwlB4mXhdJYfLe/path_desc		
PH-D14		PHIL 2004-1011 (Phil 88-626-1691 x Phil 93-2349)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/P5uZrZilcM3o3H4/path_desc		
PH-D15		PHIL 2004-0827 (Phil 79-27-0019 x Phil 93-65-0775)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/UeyzhGd2NorpCM4/path_desc		
PH-D16		PHIL 2003-1389 (Phil 89-36-0455 x Phil 88-620-1413)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/E36QbzYWtL8F52e/path_desc		
PH-D17		PHIL 2002-0359 (Phil 93-3849 x VMC 87-599)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/SpE8V2eoQncjq9v/path_desc		
PH-D18		PHIL 2001-0295 (VMC 90-239 x Phil 88-620-1413)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/Hbo9wzBDkhoH7u7/path_desc		
PH-D19		PHIL 2000-2569 (Phil 83-129-3401 x VMC 90-239)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/TQGwZppKTnLNUW0/path_desc		
PH-D2		PHIL 2005-1763 (Phil 8829 x Phil 99-0383)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/aH1VrbGLCeg2KkK/path_desc		
PH-D20		PHIL 2000-0791 (Phil 85-23-4345 x Phil 8943)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/kN0OcdQyKPNnSEb/path_desc		
PH-D21		PHIL 99-2641 (Phil 83-129-3401 x Phil 8013)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/tV0GZoFokQtyaS4/path_desc		
PH-D22		PHIL 99-1427 (Phil 81-341-3415 x Phil 92-73-1043)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/MzDN1sSh7DgCXWf/path_desc		
PH-D23		PHIL 99-1793 (Phil 93-236-3301 x Phil 8477)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/0l2584n9y834PCc/path_desc		
PH-D24		PHIL 97-2041 VARIETY Phil 97-2041 PARENTAGE Phil 90-0343 x Phil 92-3-0023 GROWTH HABIT ...
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/1wsL4JZoV8n68uw/path_desc		
PH-D25		PHIL 97-1123 VARIETY Phil 97-1123 PARENTAGE Phil 88-626-1691 x Phil 91-110-0807 GROWTH HABIT ...
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/OfMvpd9JsCnrQQ0/path_desc		
PH-D26		PHIL 97-0693 VARIETY Phil 97-0693 PARENTAGE Q 102 x Phil 84-438-5799 GROWTH HABIT ...
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/A7RgSLYiHar4Cfm/path_desc		
PH-D3		PHIL 2005-0483 (Phil 79-57-1915 x Phil 97-0693)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/JN58GpFEgFI293Y/path_desc		
PH-D4		PHIL 2005-0055 (Phil 93-34-0385 x Phil 00-156-1161)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/biDlFElyZe7thqT/path_desc		
PH-D5		PHIL 2003-1727 (Phil 93-300-4207 x Phil 93-1902349)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/ctKBJAYCy1EteOD/path_desc		
PH-D6		PHIL 2003-0021 (Phil 93-34-0385 x Phil 92-41-0727)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/WWWuRXNAG7Jn0uj/path_desc		
PH-D7		PHIL 2002-0421 (Q102 x Phil 92-44-0751)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/nYHAzZJcLN1gNvF/path_desc		
PH-D8		PHIL 2000-2417 (Phil 8717 x Phil 90-1187-1237)
https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/L5b2zxwuJbV1La9/path_desc		

PH-D9 | PHIL 2000-2155 (Akoki Green x VMC 90-239)

https://www.sra.gov.ph/view_file_custom/sugarcane_varieties/pPJNplpqsqHigC6/path_desc

PK-X039 | CoJ-84

<https://srdb.gop.pk/coj-84/>

PK-X040 | SPF-93

<https://srdb.gop.pk/spf-93/>

PK-X041 | NSG-59

<https://srdb.gop.pk/nsg-59/>

PK-X042 | YTFG-236

<https://srdb.gop.pk/ytfg-236/>

PK-X043 | CPF-253

<https://srdb.gop.pk/cpf-253/>

PK-X044 | CPF-252

<https://srdb.gop.pk/cpf-252/>

PK-X045 | CPF-251

<https://srdb.gop.pk/cpf-251/>

PK-X046 | CPF-250

<https://srdb.gop.pk/cpf-250/>

PK-X047 | CPF-249

<https://srdb.gop.pk/cpf-249/>

PK-X048 | CPF-248

<https://srdb.gop.pk/cpf-248/>

PK-X049 | CPF-247

<https://srdb.gop.pk/cpf-247/>

PK-X050 | CPF-246

<https://srdb.gop.pk/cpf-246/>

PK-X051 | SPF-213

<https://srdb.gop.pk/spf-213/>

PK-X052 | SPF-234

<https://srdb.gop.pk/spf-234/>

PK-X053 | CPF-237

<https://srdb.gop.pk/cpf-237/>

PK-X054 | CP-77 400

<https://srdb.gop.pk/cp-77-400/>

TW-29 | 新台糖29品種權

https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?article_id=32063&code=list&flag=detail&ids=308

TW-HIST | 台糖品種歷史

<https://www.taisugar.com.tw/Monthly/CPN.aspx?ms=1391&p=13385197&s=13385208>

US-2026 | LSU AgCenter 2026 Sugarcane Variety Performance

<https://www.lsuagcenter.com/articles/page1781285364986>

US-SC103 | Sugarcane Cultivars Descriptive Fact Sheet: 'CPCL 97-2730' and 'CPCL 00-4111'

<https://ask.ifas.ufl.edu/publication/SC103>

US-SC104 | Sugarcane Cultivar Descriptive Fact Sheet: CPCL 02-6848 and CPCL 05-1201

<https://ask.ifas.ufl.edu/publication/SC104>

US-SC106 | Sugarcane Cultivar Descriptive Fact Sheet: CP 06-2400, CP 06-2042, and CP 07-2137

<https://ask.ifas.ufl.edu/publication/SC106>

US-SC113 | Energy cane Cultivar Descriptive Fact Sheet: UFCP 74-1010

<https://ask.ifas.ufl.edu/publication/SC113>

US-X075 | CP 03-1912: A Sugarcane Cultivar Expanding on Sand Soil in Florida

<https://ask.ifas.ufl.edu/publication/SC111>

ZA-N12 | N12

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33432/n12.pdf>

ZA-N12-Zapyr | N12 Zapyr

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/236730/n12-zapyr.pdf>

ZA-N14 | N14

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33435/n14.pdf>

ZA-N16 | N16

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33436/n16.pdf>

ZA-N17 | N17

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33437/n17.pdf>

ZA-N19 | N19

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33440/n19.pdf>

ZA-N21 | N21

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33438/n21.pdf>

ZA-N22 | N22

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33439/n22.pdf>

ZA-N23 | N23

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33442/n23.pdf>

ZA-N24 | N24

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33441/n24.pdf>

ZA-N25 | N25

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33443/n25.pdf>

ZA-N26 | N26

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33446/n26.pdf>

ZA-N27 | N27

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33444/n27.pdf>

ZA-N28 | N28

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33445/n28.pdf>

ZA-N30 | N30

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33449/n30.pdf>

ZA-N31 | N31

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33447/n31.pdf>

ZA-N33 | N33

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33448/n33.pdf>

ZA-N35 | N35

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33451/n35.pdf>

ZA-N36 | N36

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33452/n36.pdf>

ZA-N37 | N37

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33450/n37.pdf>

ZA-N39 | N39

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33453/n39.pdf>

ZA-N40 | N40

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33454/n40.pdf>

ZA-N41 | N41

<https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33455/n41.pdf>

ZA-N42 N42	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33456/n42.pdf
ZA-N43 N43	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33458/n43.pdf
ZA-N45 N45	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33457/n45.pdf
ZA-N46 N46	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33461/n46.pdf
ZA-N47 N47	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33460/n47.pdf
ZA-N48 N48	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33459/n48.pdf
ZA-N49 N49	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33462/n49.pdf
ZA-N50 N50	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33405/n50.pdf
ZA-N51 N51	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33406/n51.pdf
ZA-N52 N52	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33407/n52.pdf
ZA-N53 N53	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33408/n53.pdf
ZA-N54 N54	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33410/n54.pdf
ZA-N55 N55	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33409/n55.pdf
ZA-N56 N56	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33412/n56.pdf
ZA-N57 N57	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33413/n57.pdf
ZA-N58 N58	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33411/n58.pdf
ZA-N59 N59	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33414/n59.pdf
ZA-N60 N60	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33415/n60.pdf
ZA-N61 N61	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33416/n61.pdf
ZA-N62 N62	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33419/n62.pdf
ZA-N63 N63	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33418/n63.pdf
ZA-N64 N64	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/243703/n64.pdf
ZA-N66 N66	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33422/n66.pdf
ZA-N67 N67	https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33421/n67.pdf

ZA-N68 N68	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33420/n68.pdf	
ZA-N69 N69	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33423/n69.pdf	
ZA-N70 N70	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33424/n70.pdf	
ZA-N71 N71	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33425/n71.pdf	
ZA-N72 N72	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33428/n72.pdf	
ZA-N73 N73	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33426/n73.pdf	
ZA-N74 N74	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33427/n74.pdf	
ZA-N75 N75	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33430/n75.pdf	
ZA-N76 N76	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33429/n76.pdf	
ZA-N77 N77	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33431/n77.pdf	
ZA-N78 N78	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33434/n78.pdf	
ZA-N79 N79	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/36114/n79.pdf	
ZA-N80 N80	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/240109/n80.pdf	
ZA-N81 N81	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/240108/n81.pdf	
ZA-N82 N82	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/287370/n82.pdf	
ZA-NCo376 NCo376	
https://sasri.org.za/download/158/3-varieties/33433/nco376.pdf	